



### ជំពូកទី ៥

## សកម្មភាពសំរាប់ទារកតូច

(ពីថ្ងៃកើតដល់ 6 ខែ)

មើលទៅទារកដែលទើបនឹងកើត នាងហាក់ដូចជាមិនសូវធ្វើអ្វីប៉ុន្មានឡើយ ។ នាងចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងអស់សំរាប់ហូបចំណីអាហារ, ដេក, សម្រាក, បត់ជើងតូច និង បត់ជើងធំ ។ ទោះបីជានាងមិនសូវដឹងអំពីអ្វីៗនៅវិញខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយ ទារកទើបនឹងកើតចាប់ផ្តើមរៀនរួចជាស្រេចអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយនៅជុំវិញខ្លួននាង ។ នាងរៀនសូត្រដោយប្រើវិញ្ញាណ :- ស្តាប់, ស្តាប់/ប៉ះ, ហិតក្លិន, ភ្នក់រសជាតិ និងគំហើញ ។

ទារកពិការភ្នែក ឬ មិនអាចមើលឃើញច្បាស់ ក៏ចាប់ផ្តើមរៀនយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈពេលដែលនាងកើតមកភ្លាមៗនោះដែរ ។ តែនាងត្រូវការឱ្យអ្នកជួយជ្រោមជ្រែង ដើម្បីណែនាំនាងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលនាងមើលមិនឃើញ ។



អ្នកអាចជួយដោយការផ្តល់ឱកាសដល់នាងឱ្យបានច្រើនចំពោះការស្តាប់, ស្តាប់/ប៉ះ និង ហិតក្លិន ។ លើកទឹកចិត្តនាងឱ្យពិនិត្យរាវរក និងលេង (របស់របរអ្វីៗដែលមាន) ។

ការម្យ នោះគឺជាស្លាបព្រា។ វាក្មេងឱ្យចង់កាន់លេងណាស់។

បើទារកមិនអាចមើលឃើញប្រដាប់លេង ឬ មុខមាត់មនុស្ស នាងពិតជាមិនដឹងថាមានព្រឹត្តិការណ៍គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងឡាយដើម្បីពិនិត្យពិចារណាឡើយ។



នាងត្រូវការឱ្យអ្នកជួយដើម្បីស្វែងរកឱ្យឃើញភាពរីករាយក្នុងការលេងជាមួយស្លាបព្រា។

ចូរនិយាយរកទារករបស់អ្នក នៅអំឡុងពេលអ្នកធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះជាមួយនាង ។ បើទោះជាអ្នកគិតថានាងនៅតូចក្នុងការយល់ដឹងពាក្យសម្តីអ្នកនិយាយចេញមកក៏ដោយ ចូរចងចាំថា ការស្តាប់សម្លេងមនុស្សម្នាក់គឺជាវិធីចម្បងមួយដែលនាងនឹងរៀនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយ ។ ចំពោះព័ត៌មានស្តីពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយទារករបស់អ្នក នៅពេលអ្នកធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះ សូមអានជំពូកស្តីពី "ការប្រាស្រ័យទាក់ទង" នៅទំព័រ 45 ។



លីតា នៅកូចណាស់។  
នាងគេងនឹងបៅ ហើយ  
បន្ទាប់មកគេងទៀត។

វាអស្ចារ្យណាស់ ទារកមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលពីរ-បីខែដំបូង  
របស់គេ? ចូរមើលមកកុសលមើល គេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។  
នៅពេលបងស្រីរបស់គេចូលមកដល់បន្ទប់ភ្លាម គេបោះឱ្យនាងលើកគេឡើង។

ដេកងើបអង្គុយជិតរួចហើយ  
តែគេមិនរឹងមាំដូចកុសលសោះ។  
មុនដំបូងខ្ញុំឮយចិត្តនឹងភាពពិការ  
ភ្នែករបស់គេណាស់ តែគេបាន  
លូតលាស់យ៉ាងច្រើនតាមវិធី  
របស់គេផ្ទាល់ ហើយស្គាល់  
សម្លេងបងស្រីរបស់គេផងដែរ។  
គេតែងតែចង់ឱ្យបងស្រីពេញភ្នែក  
នៅពេលគេឮចំនាងនៅក្បែរ។

**សកម្មភាព**

សកម្មភាពទាំងឡាយនៅក្នុងជំពូកនេះគឺបានបែងចែកជាពីរផ្នែក :- សំរាប់ទារកកើតភ្លាមដល់អាយុ 3 ខែ និង  
សំរាប់ទារក 4 ខែដល់ 6 ខែ ។ នៅពេលវ័យទាំងនេះ ជាវ័យដែលទារកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើការលើបំណិនដែលពន្យល់រៀបរាប់  
ខាងក្រោមនេះ ។ តែត្រូវចាំថាវាអាចចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីឱ្យទារកម្នាក់រៀនបំណិនថ្មីមួយ ។ ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការលើ  
បំណិនពីរ-បីក្នុងពេលតែមួយ ។ ចូរចាំថាទារកម្នាក់នឹងរៀនទៅតាមលទ្ធភាពរបស់នាង ។

**ពីថ្ងៃកើតដល់ 3 ខែ**

នៅអំឡុងពេល 3 ខែដំបូងនៃការរស់រានមានជីវិត ទារកអាចរៀនដើម្បី :-

- ស្គាល់ការបន្លឺសម្លេង ។
- ដឹងភាពខុសគ្នារវាងក្លិន ។
- និងសម្លេងដែលធ្លាប់ឮញឹកញាប់ ។
- ស្លាប និងកាន់វត្ថុ ។
- បញ្ចេញសូរសម្លេងនានា ជាជាងការយំ ។
- រីករាយនឹងការស្លាបតាមបែបខុសប្លែកពីគ្នា ។
- រកឃើញ/ស្គាល់ដៃ និងជើងរបស់ខ្លួន ។
- ចេះទប់ចិត្តខ្លួនឯង ។
- ងើបក្បាលខ្លួនឯង ។

> វិធីជួយទារកឱ្យចេះទុកចិត្តមនុស្ស និង បរិស្ថាននៅជុំវិញនាង

ទារកដែលមើលឃើញរៀនយ៉ាងឆាប់អំពីសម្លេង, ការស្ទាប និងក្លិនដែលចេញមកពីមនុស្ស ឬ វត្ថុផ្សេងៗ ។ ប្រការនេះជួយធ្វើឱ្យនាងវិនិច្ឆ័យយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយនៅជុំវិញ និងមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅជាមួយវា ហើយចង់រាវរកពិនិត្យពិចារណា ។ តែសម្លេង, ប៉ះ-ស្ទាប, និងក្លិនអាចធ្វើឱ្យទារកពិការភ្នែកភ័យខ្លាច ពីព្រោះនាងមិនដឹងថាវាចេញមកពីប្រភពណា ។ នាងត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមដើម្បីឱ្យយល់ និងមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅនៅក្នុងបរិស្ថានរបស់ខ្លួន ។

អ្នកអាចជួយនាងឱ្យយល់អំពីប្រភពសម្លេង និងវត្ថុផ្សេងៗដែលស្ទាបទៅខុសៗពីគ្នា ថាតើពួកវាមកពីណា ។ ចូរជួយនាងឱ្យដឹងថាការរៀនអំពីវាអាចនឹងសប្បាយរីករាយ ។



នេះគឺជាប៉ារ៉ូបស់កូន។ កូនស្ទាបពុកមាត់ប៉ារ៉ូមើល?

កូនរបស់អ្នកត្រូវការឱ្យអ្នកជួយប្រាប់នាងឱ្យដឹងថាអ្វីៗនឹងកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀត ដោយសារតែនាងមិនអាចមើលឃើញអ្វីៗដែលរៀបរយនឹងកើតឡើង ។ ឧទាហរណ៍ :-

ចូរស្ទាបជើងនាងថ្មមៗ មុនពេលប្តូរកន្ទុបឱ្យនាង។ ចូរប្រាប់នាងឱ្យដឹងថាអ្នករៀបនឹងធ្វើអ្វី។ ក្នុងពេលបន្តមកយ៉ាងឆាប់រហ័សនាងនឹងដឹងថាអ្នកបំរុងប្តូរកន្ទុបឱ្យនាងនៅពេលអ្នកស្ទាបជើងរបស់នាង ។



វីណា ម៉ាក់នឹងប្តូរកន្ទុបសើមចេញពីកូនឥឡូវនេះ។

ចូរប៉ះស្មាវាថ្មមៗមុនពេលលើកនាងឡើង។ ចូរប្រាប់នាងឱ្យដឹងថាអ្នករៀបនឹងធ្វើអ្វី។ យ៉ាងឆាប់រហ័សនាងនឹងដឹងពីនិយ័នៃការប៉ះរបស់អ្នក ។



ផល្លា ប៉ានឹងលើកកូនឡើងឥឡូវនេះ។



> វិធីលើកទឹកចិត្តទារកឱ្យចេះឆ្លើយតបទៅមនុស្ស និង សម្លេង

ទុកទារកនៅក្បែរអ្នក នៅពេលកូនភ្ញាក់ពីដេក ។ និយាយរកកូន ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឱ្យនាងដឹងថាអ្នកនៅក្បែរ ។ នាងនឹងរៀនសំគាល់សម្លេងរបស់អ្នក និងឆ្លើយតប ទៅវិញ ។

រដ្ឋា ឮសូរសម្លេង នោះទេ? ម៉ែកំពុង ច្រូតស្រូវ។



ចូរលើកទឹកចិត្តសមាជិកគ្រួសារឱ្យនិយាយជាមួយកូន អ្នកអំពីអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើ ។ បើបុគ្គលម្នាក់ធ្វើសកម្មភាព មួយជាប្រចាំដូចជា ដូតទឹកឱ្យនាងរៀងរាល់លើក, នាងនឹងចាប់ ផ្ដើមស្គាល់សមាជិកនៃគ្រួសារតាមរយៈសកម្មភាពដែលបុគ្គល នោះធ្វើ ។

ស្រីនី មីងនឹងលាង សំអាតដៃរបស់កូន។




នរណាជាកូនស្រីតូច ច្រម៉ក់របស់ប៉ាហ្នឹង?

ចូរលើកទឹកចិត្តកូនឱ្យចេះញញឹមដោយការនិយាយទៅរកនាង ។ នាងអាចញញឹមម្ដងទៀត បើសិនជាអ្នកផ្ទុំទើងលើពោះរបស់នាង ឬ លេង ម្រាមជើងរបស់នាង ។

ច្រៀង និងលេងភ្លេងឱ្យទារកអ្នកស្ដាប់ ។ បើសិនជានាងធ្វើ សម្លេងគ្រាប់តាម ចូរលើកទឹកចិត្តឱ្យនាងបន្តិចសូរសម្លេងរបស់ខ្លួន ។






នៅពេលទារករបស់អ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើសម្លេងលេងជាមួយនាងដោយយកដៃរបស់នាងដាក់លើមាត់ និងបំពង់ករបស់អ្នក នៅខណៈពេលដែលអ្នកធ្វើសម្លេងនោះម្តងហើយម្តងទៀត ។ ប្រការនេះជួយនាងឱ្យដឹងថាសម្លេងចេញមកពីណាផងដែរ ។

➤ វិធីជួយកូនឱ្យស្គាល់ដៃ និង ជើងរបស់នាង ហើយចេះប្រើដៃរបស់នាងដើម្បីកាន់វត្ថុ

ចូរទាញដៃទារករបស់អ្នកថ្មីៗខិតលើនៅពេលអ្នកបំបៅនាងដើម្បីឱ្យនាងចេះដាក់ដៃលើដោះរបស់អ្នក ។ ប្រការនេះជួយត្រៀមនាងឱ្យចេះកាន់វត្ថុ ។ បំបៅកូនគឺជាពេលដ៏ល្អដើម្បីនិយាយ ឬ ច្រៀងទៅរកទារករបស់អ្នក ។



ព្យាយាមចងប្រដាប់លេងដែលបញ្ចេញសូរសម្លេងដូចជាកណ្តឹង, គ្រាប់រុក្ខជាតិដាក់ក្នុងកំប៉ុង ឬ ខ្សែដៃ-នៅកដៃ ឬ កជើងរបស់ទារក ។ នាងនឹងព្យាយាមរកសម្លេងនោះដោយដៃម្ខាងទៀត និងលេងជាមួយវា ។

ដាក់ទារកឱ្យដេកផ្អែមដោយមានរមួរកំណាត់ ឬ ខ្នើយអាចកល់ពីក្រោយខ្នងនាងសំរាប់ជួយទប់ ។ នាងនឹងយកដៃទាំងពីរមកលេងតាមនិស្ស័យធម្មជាតិ ។



ចូរចងចាំថា វត្ថុតូច ឬ ល្អិតអាចធ្វើឱ្យកុមារឆ្លាក់ អ្នកគួរយកវាចេញកុំឱ្យនាងលេងវាទៀត បើនាងព្យាយាមយកប្រដាប់លេងតូច ឬ វត្ថុតូចល្អិតដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់នាង។

ចូរឱ្យកូនកាន់វត្ថុផ្សេងៗដែលពេលនាងស្លាប់ទៅ វាមានសភាពខុសពីគ្នាដូចជា ដុំអ្វីមួយដែលរលោង, ផ្ទាំងកំណាត់សូត្រទន់, និងផ្ទាំងកំណាត់ដែលគគ្រាត ។ អ្នកក៏អាចលើកទឹកចិត្តនាងឱ្យទាញវត្ថុនានាដូចជា អង្កាដីមាំមួយខ្សែ ឬ ចំណងខ្សែចុងជាកងៗ ។ បើសិនជាអ្នកទាញខ្សែមកវិញបន្តិច នាងអាចប្រឹងទាញកាន់តែខ្លាំងឡើង ។



ចូរប្រយ័ត្នឱ្យមែនទែន កុំឱ្យនាងធ្លាក់ ឬ លេបគ្រាប់អង្កា

ដំបូង ម៉ាក់ច្របាច់ថ្មមៗ លើទ្រូងរបស់កូន ប៉ុណ្ណា។



ចូរព្យាយាមធ្វើម៉ាស្សាឱ្យទារកថ្មមៗពាសពេញរាងកាយដោយប្រើប្រែងឆាម្លូប (ចំរាញ់ចេញពីបន្លែ) ឡេលាបស្បែក ឬ ដៃទទេរបស់អ្នក ។ ចូរចាប់ផ្តើមពីទ្រូងរបស់ទារក ឆ្ពោះទៅដៃរបស់ក្មេង, បន្ទាប់ឆ្ពោះទៅកូន និងចុះទៅជើងរបស់នាង ។ បន្ទាប់ពីទារកស្ងៀមការម៉ាស្សារបស់អ្នក ចូរព្យាយាមប្រើកំណាត់ដែលមានសភាពខុសៗគ្នា (ឧទាហរណ៍ :- ទន់, ស្តើង, រលោង, ក្រាស់, ត្រើម ឬ ស្បើប) ដើម្បីជូតខ្លួនឱ្យទារក ។ ក្រោយមកទៀតលើកទឹកចិត្តកូនឱ្យស្លាប់ចំណែកផ្សេងៗទៀតនៃរាងកាយរបស់នាង ឧទាហរណ៍ - យកដៃនាងទៅប៉ះជើងរបស់នាង ។

នេះជាម្រាមជើងរបស់កូន!



នៅពេលអ្នកលេងកំសាន្តជាមួយកូន ចូរស្លាប់ប្រអប់ដៃ និងប្រអប់ជើងរបស់នាង ។ ទះប្រអប់ដៃ-ជើងនាងស្រាលៗ ឬ ផ្អុំវាតិចៗ ហើយហៅឈ្មោះវា ។

➤ វិធីជួយទារកអភិវឌ្ឍការទប់លំនឹងក្បាលរបស់ខ្លួន

សាច់ដុំករបស់ទារកលូតលាស់មាំមួន នៅពេលនាងដេកក្រឡាប់ និងងើបក្បាលឡើង ។ ទារកដែលមើលឃើញនិងងើបក្បាលឡើងដើម្បីដើរមើលទៅអ្វីៗទាំងឡាយ តែទារកដែលមិនអាចមើលឃើញនិងត្រូវការហេតុផលដើម្បីងើបក្បាលរបស់ខ្លួន ។ ទារកជាច្រើនរូបអាចមិនចូលចិត្តដេកក្រឡាប់ ។ កូនរបស់អ្នកប្រហែលជាកាន់តែចង់ងើបក្បាល បើសិនជាអ្នក :-

ដាក់កូនឱ្យក្រឡាប់លើទ្រូងរបស់អ្នក ។ បើសិនជាមុខនាងនៅជិតមុខរបស់អ្នក នាងនឹងចង់ងើបក្បាលឡើងនៅពេលនាងឮសម្លេងអ្នក ឬក៏នាងចង់ប៉ះមុខអ្នក ។ អ្នកក៏អាចក្រសោបដៃអ្នកជុំវិញខ្លួននាង ហើយយោលយោតនាងទៅវិញទៅមក ។



បញ្ឈរជង្គង់របស់អ្នក ហើយដាក់កូនឱ្យពោបលើជង្គង់ដោយប្រើដៃរបស់អ្នកជួយទប់កូន ។ អង្រួនកូនដោយកម្រើកជង្គង់របស់អ្នក ។ នេះជាវិធីងាយមួយក្នុងការទប់កូនរបស់អ្នក និងលើកទឹកចិត្តនាងឱ្យងើបក្បាល ហើយពង្រឹងសាច់ដុំករបស់កូន ។ វាក៏ជួយត្រៀមរៀបចំកូនឱ្យចេះវារផងដែរ ។



ឱ្យកូនស្លាបប្រដាប់លេងដែលបញ្ចេញសូរសម្លេង ហើយក្រឡុកវាប្រហែល 15 សង់ទីម៉ែត្រពីលើក្បាលរបស់នាង ។ ជារឿយៗ នាងនឹងងើបក្បាលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅសម្លេងនោះ ។



➢ វិធីជួយទារកឱ្យចេះរារកពិនិត្យពិចារណាវត្ថុតាមរយៈការភ្ជាក់រសជាតិ និង ហិតក្លិន

ដំបូងទារករៀនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយនៅជុំវិញខ្លួនដោយការភ្ជាក់រសជាតិ និងការរកវត្ថុនានាជាមួយនឹងមាត់របស់ខ្លួន ។ ប្រការនេះគឺសំខាន់យ៉ាងពិសេសចំពោះកុមារមិនអាចមើលឃើញច្បាស់ ដោយសារពួកគេត្រូវតែរៀនយ៉ាងច្រើនតាមរយៈវិញ្ញាណដទៃទៀត ។ ប្រដាប់ប្រដាទាំងអស់ដែលទារកលេងគួរតែលាងសំអាតឱ្យស្អាតបាត ហើយប្រដាប់ប្រដាទាំងនោះគួរតែផ្តល់ដើម្បីកុំឱ្យទារកឆ្កាក់ ។

ចូរយកម្រាមដៃរបស់អ្នកប៉ះមាត់ទារកស្រាលៗ ។ ឱ្យទារកជញ្ជាក់ម្រាមដៃរបស់អ្នក និងរារកពិនិត្យម្រាមដៃនោះ ។



នៅពេលទារករបស់អ្នកអាចកាន់វត្ថុដោយខ្លួនឯង ចូរលើកទឹកចិត្តនាងឱ្យហិតក្លិន និងលិតដើម្បីស្ទង់រសជាតិរបស់វត្ថុនោះ ។

➢ វិធីជួយទារកឱ្យទទួលបានអារម្មណ៍នៃការស្តាប់/ប៉ះតាមប្រភេទខុសៗគ្នា

ចូរលេងល្បែងកំសាន្តដោយការដាក់ចំណែកនៃរាងកាយរបស់ទារកក្នុងទឹក ហើយហៅឈ្មោះចំណែករាងកាយនីមួយៗ ។

ម៉ី-ម៉ី នោះគឺប្រអប់ដៃរបស់ឯងនៅក្នុងទឹក ។



ចូរលើកទឹកចិត្តកូនឱ្យស្តាប់អ្វីមួយដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងមានក្លិនក្រអូបខ្លាំង - ដូចជា ផ្លែឈើ បន្លែ ឬ ផ្កា ។



➤ វិធីជួយទារកត្រៀមបម្រុងឱ្យចេះក្រឡាប់

ទារកដែលអាចមើលឃើញរឿនក្រឡាប់នៅពេលនាងស្រវាចាប់របស់របរទាំងឡាយ ។ បើទារករបស់អ្នកមិនអាចមើលឃើញច្បាស់ អ្នកប្រហែលជាត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងនាងឱ្យរឿនក្រឡាប់ ។ នៅពេលក្បាល, ក, និងស្មារបស់នាងមាំមួន អ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថា ទារកចេះទប់ក្បាលខ្លួនឯងឡើង និងងាកនៅពេលនាងពូសម្លេង ។ ឥឡូវនេះទារកអាចត្រៀមរៀបចំដើម្បីរឿនក្រឡាប់ ។

កាន់ឱ្យជាប់ ភ្នាក់... ម៉ែទាញ កូនឱ្យក្រឡាប់មកខាងនេះ។

នៅពេលកូនដេកពោបនឹងពោះ ចូរក្រឡុកប្រដាប់លេងដែល បញ្ចេញសម្លេងគីកកងខាងលើក្បាលនាង ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនាងឱ្យងើប ក្បាលឡើងលើ ។ នៅពេលកូនចាប់យកប្រដាប់លេង ចូរវិកលវាទៅ ក្រោយខ្នងនាងដើម្បីជួយនាងឱ្យផ្លាស់ទៅលើខ្នងខ្លួនឯងវិញ ។



ចូរដាក់ទារករបស់អ្នកឱ្យដេកចំហៀងខ្លួនដោយកល់កំណត់ ឬ កល់ខ្នើយនៅ ពីក្រោយខ្នងកូន ។ ក្រឡុកប្រដាប់លេងដែលបញ្ចេញសូរសម្លេងគីកកងនៅពីមុខនាង ហើយវិកលប្រដាប់លេងចុះក្រោមឆ្ពោះទៅរកកម្រាលផ្ទះ ។ ពេលនោះកូននឹងបែរ ក្បាល និងស្មាទៅតាមវា-កូននឹងពោបទៅលើពោះរបស់នាងដោយខ្លួនឯង ។



តី 4 ខែ ដល់ 6 ខែ

នៅពេលទារកចាស់ខែបន្តិច នាងអាច :-

- ញញឹមនៅក្នុងន័យឆ្លើយតបទៅនឹងសម្លេងមនុស្ស ឬ សម្លេងអ្វីមួយដែលនាងឆាប់ឮ។
- រាវរកពិនិត្យពិច័យរាងកាយរបស់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យដឹងថាវាយ៉ាងដូចម្តេច។
- ធ្វើសម្លេងដែលដូចពាក្យអ្វីមួយ តែមិនមានន័យអ្វីដែលអាចឱ្យយល់បាន (កកែកករ)។
- ប្រើដៃចាប់យកវត្ថុផ្សេងៗទៅដាក់មាត់របស់នាង។
- ប្តូរវត្ថុពីដៃម្ខាងទៅដៃម្ខាងទៀត។
- ឈោងយកប្រដាប់លេងដែលនាងស្តាប់ឮ, ប៉ះ ឬ មើលឃើញ។
- ក្រឡាប់ពីខ្នងទៅពោះ និងពីពោះទៅខ្នងរបស់នាងវិញ។
- ត្រៀមរៀបចំដើម្បីរៀនអង្គុយ និង វារ (ឧទាហរណ៍ ដោយព្យាយាមរក្សាលំនឹងនៅអំឡុងពេលអង្គុយលើជង្គង់របស់អ្នកណាម្នាក់)។

**នៅអំឡុងរយៈពេលនេះ ទារកពិការភ្នែកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើតាមចលនាទាំងឡាយម្តងហើយម្តងទៀត។**

ជាញឹកញយកុមារពិការភ្នែកតែងធ្វើចលនាចម្លែកៗម្តងហើយម្តងទៀតដូចជា ញញឹកខ្លួនឯង, ទទះដៃភីបៗដូចសត្វស្លាប, យោលយោគរាងកាយខ្លួនឯង។ គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពិតប្រាកដពីមូលហេតុដែលករណីនេះកើតឡើងនោះទេ។ វាប្រហែលជាដោយសារទារកគ្រប់រូបត្រូវការរាវរកពិនិត្យពិច័យ និងលេងកំសាន្ត។ បើនាងមិនដឹងថាមានអ្វីៗគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅជុំវិញខ្លួន ទារកនឹងលេងតែជាមួយអ្វីដែលនាងដឹង ឬ រាងកាយខ្លួនឯង។



អ្នកអាចសំគាល់ឃើញចលនាទាំងនេះ នៅមុនពេលទារករបស់អ្នកមានអាយុ 6 ខែ។ ចលនាទាំងនេះអាចជាបញ្ហាចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់ទារក បើចលនាទាំងនេះរំខានទារកពិការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្ស និងអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួន។ នៅពេលនាងធំឡើង ក្មេងដទៃអាចមិនចង់លេងជាមួយនាង ពីព្រោះចលនាចម្លែករបស់នាងធ្វើឱ្យពួកគេខ្លាច។ សកម្មភាពទាំងឡាយនៅក្នុងជំពូកនេះ នឹងជួយទារករបស់អ្នកឱ្យមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីរៀនសូត្រអ្វីៗដែលថ្មី។ ចូរលើកទឹកចិត្តទារក


របស់អ្នកឱ្យចេះរាវរកពិនិត្យពិច័យ និងលេងកំសាន្ត ហើយនាងប្រហែលជាធ្វើចលនាចម្លែកទាំងនេះតិចទៅៗ។



➤ វិធីលើកទឹកចិត្តទារកឱ្យចេះឈោងចាប់ និង កាន់របស់របរ


ឱ្យទារកស្លាប់វត្ថុដែលមានសភាពខុសៗគ្នានៅពេលនាងប៉ះវា - ឧទាហរណ៍ វត្ថុដែលមានរោម-ព្រួយ, វត្ថុទន់-រលោង, ប្រដាប់លេងកំពឹកកំពក-ត្រើមៗ ។ នៅក្រោយពេលនាងចាប់ផ្តើមលេងជាមួយពួកវាហើយ ចូរបង្ខិតវាឱ្យឆ្ងាយពីនាងបន្តិច ។ គោរវត្ថុលើកម្រាលផ្ទះ ធ្វើដូច្នោះនាងដឹងថា វានៅកន្លែងណាមួយ ។

វ៉ិត ឈោងយក បាល់កំពឹកកំពក របស់ឯងមើល!



ក្រឡុកវត្ថុដែលបង្កើតសម្លេងតិកកងទាល់តែនាងស្រវាចាប់វា (ដំបូងអ្នកប្រហែលជា ត្រូវរុញកែងដៃទារកច្នៃមៗទៅរកវត្ថុ) ។ បន្ទាប់មកលើកទឹកចិត្តនាងឱ្យក្រឡុកវា និងប្តូរវាពីដៃម្ខាងទៅដៃម្ខាងទៀត ។ ប្រការនេះនឹងជួយនាង ឱ្យដឹងថាសម្លេងចេញមកពីណា ព្រមទាំងធ្វើ ឱ្យដៃរបស់នាងកាន់តែរឹងមាំទៀតផង ។

យកខ្សែខ្លីមួយចងភ្ជាប់វត្ថុទៅនឹងអារវ ឬ ចងវានៅដៃរបស់ទារក ។ បើសិន នាងធ្វើជ្រុះប្រដាប់លេង ចូរនាំដៃនាងបង្ហូតតាមខ្សែទាល់តែដល់ខាងលើ ឬ ដល់ចុងខ្សែដែលភ្ជាប់ទៅប្រដាប់លេង ។ ប្រការនេះនឹងលើកទឹកចិត្តនាង ឱ្យឈោងរកប្រដាប់លេងដោយខ្លួនឯង ហើយដឹងថា វត្ថុដែលនាង ធ្វើជ្រុះនោះ វាមិនបាត់ទៅណាឡើយ ។



ទុកវត្ថុពីរ-បីនៅកន្លែងដដែល ធ្វើដូច្នោះនាងអាច រៀនសូត្ររកវានៅកន្លែងនោះ ។

➤ វិធីជួយទារកឱ្យក្រឡាប់

បើអ្នកបានធ្វើសកម្មភាពនៅទំព័រ 39 អ្នកបានជួយទារកឱ្យចេះក្រឡាប់ដោយការទាញវត្ថុ ឬ ដាក់អ្វីមួយកល់ពីក្រោយខ្នងនាង។ ឥឡូវនេះនាងអាចក្រឡាប់ជាមួយការជួយតិចតួច។



នៅពេលទារកដេកពោប ចូរប្រើវត្ថុដែលបញ្ចេញសម្លេងគឺកងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កូន ដូចពេលអ្នកបានធ្វើពីមុនដែរ នៅពេលទារកស្រវាយកវត្ថុនៅចំហៀងខ្លួន ចូរលើកវត្ថុឡើងទៅលើធ្មេញដូច្នោះនាងត្រូវតែស្រវាយចាប់វាឆ្ងាយជាងមុន។ បើសិនជានាងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ នាងនឹងបង្វិលទៅចំហៀងខ្លួន ហើយបន្ទាប់មកផ្លាស់ទៅលើខ្នងនាងវិញ។

នៅពេលទារកដេកផ្លាស់ លើកទឹកចិត្តនាងឱ្យស្រវាយចាប់វត្ថុមានសម្លេងគឺកងដែលកាន់ទៅម្ខាង។ ជួយទារកឱ្យរុលឆ្ពោះទៅរកប្រដាប់លេងនោះ ដោយផ្លៀងទៅចំហៀងខ្លួន ឬ ក្រឡាប់លើពោះខ្លួនឯង។



➤ វិធីត្រៀមរៀបចំទារកឱ្យចេះអង្គុយ

បើសិនជាទារករបស់អ្នកមិនទាន់ចេះអង្គុយដោយខ្លួនឯង សកម្មភាពទាំងនេះអាចជួយនាងត្រៀមរៀបចំដើម្បីចេះអង្គុយ។

កាន់កូនឱ្យអង្គុយលើជង្គង់របស់អ្នក បែរមុខទល់គ្នា ហើយដៃអ្នកទប់ខ្នងនាងពីក្រោយ។

ស្តាប់តាតា និងប្តីយាយ។ ពួកគេធ្វើបាល់ពីដីឥដ្ឋ។



ឱ្យកូនអង្គុយផ្នែកនឹងរាងកាយអ្នកបន្តិច ដោយអ្នកត្រូវអង្គុយផ្តិបពីក្រោយខ្នងកូន។



នេះជារបៀបដែល  
យើងជិះសេះទៅមកៗ

ដាក់ទារករបស់អ្នករាងបន្តរដៃបន្តិច ដោយឱ្យនាងអង្គុយលើជង្គង់អ្នក ។ ចូរលើកជង្គង់ម្ខាងឱ្យរាងខ្ពស់បន្តិច ដើម្បីឱ្យកូនអ្នកផ្ទៀងរាងទេរទៅម្ខាង ។ បន្ទាប់មកបត់ជង្គង់ម្ខាងទៀតរបស់អ្នក ។ កូននឹងរៀនទេរខ្លួន ដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួននាងមានលំនឹង ។

➤ វិធីជួយទារកឱ្យចេះវារ

ដើម្បីចេះវារ ទារកត្រូវការដៃនិងស្នាដៃលើវិញមាំ ។ នាងត្រូវតែអាចរក្សាលំនឹងខ្លួននៅពេលទម្ងន់ខ្លួនផ្ទេរពីម្ខាងទៅម្ខាងផងដែរ ។ សកម្មភាពទាំងនេះអាចជួយនាងបាន ។

ដាក់ទារករបស់អ្នកឱ្យវារជើងបួនដោយក្រុងសងខាងពីលើខ្នើយឱបវែង ឬ រមូកំណាត់ ។ ខ្នើយឱប ឬ រមូកំណាត់គួរតែធំល្មម ដែលអាចជួយគាំទ្រនាងបានខ្លះ តែតូចល្មមដែលអាចឱ្យនាងទប់ទម្ងន់ខ្លួនឯងបានខ្លះផងដែរ ។ យោលយោគនាងទៅមុខទៅក្រោយ និងពីម្ខាងទៅម្ខាង ។



សូនី ប្រឹងឡើង  
បើងអាចធ្វើបាន។



កូនអាចរកចង្រ្កង់  
ឃើញទេ យូរី?

ដាក់ទារករបស់អ្នកឱ្យវារជើងបួនដោយក្រុងសងខាងពីលើស្នុងជើងរបស់អ្នក ឬ រមូកំណាត់ ។ លើកទឹកចិត្តឱ្យនាងឈោងចាប់ប្រដាប់លេងទៅម្ខាង នៅពេលដែលដៃ និងជង្គង់នាងនៅចំហៀងខ្លួន ម្ខាងទៀតជួយទ្រទម្ងន់ខ្លួនមួយចំនួន ។ ចូរធ្វើដូចគ្នានេះ នៅចំហៀងខ្លួនម្ខាងទៀត ។

> វិធីជួយទារកឱ្យបានសប្បាយរីករាយ និង អារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពលើការបំណាស់ទីតាំងដោយខ្លួនឯង

អ្នកអាចជួយទារករបស់អ្នកឱ្យរីករាយក្នុងការបំណាស់ទីតាំង ដោយឱ្យនាងបំណាស់ទីទៅតាមវិធីជាច្រើនខុសៗគ្នា។ ចូររក្សាការនិយាយទៅរកនាងនៅពេលអ្នកធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះ។ ប្រការនេះជួយបន្ថយការភ័យខ្លាចរបស់នាង នៅពេលនាងកំពុងធ្វើអ្វីមួយថ្មី។ ឧទាហរណ៍ :-



យោលនាងទៅវិញទៅមកលើកំណាត់មួយផ្ទាំង ឬ អង្រឹង។



ចូរលេងកំសាន្តដែលអ្នក និង បុគ្គលម្នាក់ទៀតហុចទារកឱ្យឆ្ងាញ់ទៅវិញទៅមក។

ចូរប្រឌិតចលនារាងកាយដើម្បីអនុវត្តរួមគ្នា។ ចូរបត់ជើងរបស់កូន ហើយរំកិលវាទៅវិញទៅមក។ ជួយកូនឱ្យចេះយកដៃផ្តិតកាត់លើកណ្តាលខ្លួននាង ហើយត្រឡប់ទៅវិញម្តងទៀត។ យកដៃនាងទាំងពីរផ្តិតចូលគ្នា ហើយទះវា។ ប្រើពាក្យដូចៗគ្នាក្នុងពេលនិមួយៗដើម្បីហៅឈ្មោះអ្វីៗដែលអ្នកធ្វើ។



យកក្រមា ឬ កំណាត់ចងកូនព័ទ្ធជុំវិញក្រោយខ្នងអ្នក ហើយរត់ ឬក៏លោត។