

ពិការខួរក្បាលដោយមានការលុតលាស់យឺត (Mental Retardation)

បញ្ហាអន់ វិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញស្រវឹង និងមូលហេតុផ្សេងៗទៀត (Down Syndrome, Cretinism, and Other Causes)

បញ្ហាអន់ គឺជាការលុតលាស់យឺតនៃសតិប្រាជ្ញារបស់កុមារ ។ កុមាររៀនអ្វីៗយឺតជាងកុមារដទៃ ក្នុងវ័យដំណាលគ្នា ។ គេអាចយឺតនៅពេលចាប់ផ្តើមធ្វើចលនាសើច បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ ការប្រើដៃ អង្គុយ ដើរ និងយាយ និងយល់ដឹង ។ ឬគេអាចលុតលាស់ជំនាញមួយចំនួននៃជំនាញទាំងនេះបានលឿន ប៉ុន្តែយឺតផ្នែកផ្សេងៗទៀត ។

បញ្ហាអន់មានលំដាប់ពីស្រាលទៅធ្ងន់ធ្ងរ ។ កុមារដែល *អន់បញ្ហាការិតស្រាល* ត្រូវចំណាយពេលច្រើន ដើម្បីរៀនជំនាញមួយចំនួន ។ ប៉ុន្តែដោយមានជំនួយ គេអាចធំឆាត់ ថែរក្សាខ្លួនឯង និងចូលរួមដោយសកម្ម ហើយទទួលខុសត្រូវក្នុងសហគមន៍ ។ កុមារដែល *អន់បញ្ហាការិតធ្ងន់ធ្ងរ* នៅពេលដែលគេធំឡើង គេអាចនៅតែបិតក្នុងវ័យទារក ឬកុមារតូចៗ ។ គេនឹងតែងតែត្រូវការការថែរក្សាក្នុងមធ្យោបាយមួយចំនួន ។

បញ្ហាអន់មិនអាចព្យាបាលបានទេ ។ ប៉ុន្តែគ្រប់កុមារអន់បញ្ហាអាចត្រូវបានជួយដើម្បីឱ្យលុតលាស់បានយ៉ាងឆាប់ ។ ការជួយ ឬការពេញកំណត់ ជាពិសេសកាន់តែចាប់ផ្តើមបានលឿន នោះសមត្ថភាពកាន់តែច្រើន ដែលកុមារទំនងជាទទួលបាន ។

សំខាន់៖ នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងមើលលើមូលហេតុមួយចំនួន នៃការអន់បញ្ហា និងពិការភាពដោយសង្ខេប ពីទំរង់សាមញ្ញពីរ (បញ្ហាអន់ និងវិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញស្រវឹង) ប៉ុន្តែបញ្ហាអន់គ្រាន់តែជាមូលហេតុមួយ នៃមូលហេតុទាំងអស់ សំរាប់ការលុតលាស់យឺតនៅលើកុមារ ។ កុមារដែលពិការភ្នែកនឹងយឺតក្នុងការរៀនយោង និងធ្វើចលនាចុះឡើង *ប្រសិនបើគេពុំ* មានការជួយ



ដោយមានការជួយ កុមារបញ្ហាអន់មួយចំនួនអាចរៀនអាន និងសរសេរ និងធ្វើអ្វីៗជាច្រើនដូចដែលកុមារដទៃអាចធ្វើ ។ (រូបភាពរបស់កុមារដែលអន់បញ្ហានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចតដោយ ខារូលីន វ៉ាតសន៍ ឧបក្កមដោយមូលនិធិកុមារ គ្រីស្ទាន)

និងការលើកទឹកចិត្តបន្ថែម ។ កុមារដែលធ្ងន់ និងយឺតក្នុងការរៀនទំនាក់ទំនងប្រសិនណា បើគេមិនត្រូវបានជួយឱ្យរៀន "និយាយ" តាមវិធីផ្សេងៗជាងការនិយាយ ។ កុមារដែលពិការរៀនកាយធ្ងន់ធ្ងរ តែងតែយឺតក្នុងការវិវត្តន៍ ការប្រើទាំងកាយ និងសតិបញ្ញា ។ ព្រោះការ "លុតលាស់យឺត" ជារឿងធម្មតាសំរាប់ជនពិការជាច្រើន យើងនឹងបញ្ចូលការពិភាក្សាពីវា នៅក្នុងមេរៀនដោយឡែក បី ឬបួនមេរៀន ។

ព័ត៌មានស្តីពីការជួយកុមារដែលអន់ខាងបញ្ហា ឬលុតលាស់យឺតនៅក្នុងជំពូកទី ១០ ។ ជំពូកទី ១០ និងទី ១១ ពិភាក្សាពីការអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច និងវិធីជួយ ឬ "ពេញកំណត់" កុមារឱ្យរៀនជំនាញដំបូង (ដូចជាការប្រើវិញ្ញាណ ការធ្វើចលនា និងការទំនាក់ទំនង) ។ ការពិភាក្សាពីការរៀនថែរក្សាខ្លួនឯង (ការបញ្ជាក់អាហារ ការស្លៀកពាក់ ការបន្ទោរបង់ និងការងូតទឹក) និងជំពូកដែលពិភាក្សាពីចរិករបស់កុមារ និងវិធីលើកទឹកចិត្ត *ចរិក* ដែលជួយដល់ការសិក្សា ។


គំនិតផ្សេងទៀត ដើម្បីជួយកុមារដែលអន់បញ្ហា នៅក្នុងសកម្មភាពពិការទៅកុមារ ។ តំរូវការ និង បញ្ហារបស់កុមារអន់ខាងបញ្ហានៅពេលដែលគេធំឆាត់ខាងភេទត្រូវបានពិភាក្សា ។

តំរូវការចាំបាច់មួយទៀត ដែលយើងពុំបានបញ្ចូលលំអិតនៅក្នុងសៀវភៅនេះ គឺការសិក្សាសំរាប់កុមារអន់បញ្ហា ។ លទ្ធភាពខ្លះត្រូវបានពិភាក្សាស្តីពីការសិក្សា ។ ប៉ុន្តែតែងតែត្រូវការវិធីសាស្ត្រ និងសំភារៈបង្រៀនផ្នែកសង្គម ។ សៀវភៅដែលប្រណិតគឺ *ការសិក្សាពិសេសសំរាប់កូនសិស្សពិការផ្នែកបញ្ហា* ។ ចំពោះឧបករណ៍លេងដែលជួយកុមារឱ្យរៀន ។

មូលហេតុនៃបញ្ហាអន់

មានមូលហេតុជាច្រើន ដូចជា :

- មូលហេតុតែងតែពុំត្រូវបានដឹង
- កុមារមួយចំនួនកើតមកមានខួរក្បាលតូច ឬខួរក្បាលមិនលូតលាស់ ឬមិនដំណើរការដូចធម្មតា
- ជួនកាលមាន "កំហុសឆ្គងនៅក្នុងក្រូម៉ូសូម" ឬក៏សារគីមីតូច ដែលកំណត់កុមារដូចនឹងអ្វី (គំណរពូជ) ។ នេះជាអ្វីដែលកើតនៅក្នុងបញ្ហាអន់ ។
- ជួនកាលម្តាយមិនបានទទួលអារហារ ឬសារជាតិវីមួយចំនួន គ្រប់គ្រាន់ អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ។ (ចូរមើល "ជំងឺវិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញសែរីយ" នៅទំព័រ ១០៦) ។
- ការខូចខួរក្បាល អាចកើតមានឡើងផងដែរ ពីមុនអំឡុងពេលបូបន្ទាប់ពីប្រសូត ។ បន្ថែមពីការអន់បញ្ហា កុមារទាំងនេះអាចខូចខួរក្បាលបញ្ហាចលនា ភាពពិការភ្នែក ភាពថ្លង់ឬប្រកាច់ ។ មូលហេតុសាមញ្ញនៃការអន់បញ្ហា មកពីខួរក្បាលខូចត្រូវបាន ពិភាក្សានៅក្នុងជំពូកទី ២ និងរួមមាន :
 - រោគកញ្ជ្រើលអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ។
 - រោគរលាតស្រោមខួរ(ដំបៅខួរក្បាល) ដែលបណ្តាលមកពីបាក់តេរី រោគរបេង ឬជំងឺគ្រន់ចាញ់ ភាគច្រើនតែងតែកើតនៅអំឡុងពេលកុមារភាពដំបូង ។
 - ក្បាលប៉ោងធំ ជាញឹកញយជាមួយនឹង គម្លាតពីកំណើត (ចូរមើលទំព័រទី ៥១) ។
 - គ្រោះថ្នាក់ក្បាល ។
 - មូលហេតុផ្សេងទៀតដែលរួមមាន ដុះសាច់ខួរក្បាល ការពុលសំណរ ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត ឱសថ និងអារហារមួយចំនួន និងទំរង់នៃដំណើរមិនប្រក្រតីរបស់សរីរាង្គសាច់ដុំ ឬលែងលូតលាស់ ។



កុមារដែលមានទំហំក្បាលតូចពេក គឺមានបញ្ហាយឺត ហើយជួនកាលមានបញ្ហាខាងការវិវត្តន៍រាងកាយ ។

នៅកន្លែងជាច្រើននៃពិភពលោក មូលហេតុសាមញ្ញបំផុតនៃបញ្ហាអន់ គឺការខូចខួរក្បាល និងការអន់បញ្ហា ប៉ុន្តែនៅតំបន់ភ្នំ វាតែងបណ្តាលមកពីការ **ខ្វះអ៊ីយ៉ូត** នៅក្នុងអារហារ និងទឹក ។

ជាធម្មតាគ្មានការព្យាបាលសំរាប់ការអន់បញ្ហាទេ ។ អាស្រ័យដូចនេះ យើងតែងតែមិនត្រូវការដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដឡើយ ។ ជាជំនួស យើងត្រូវការជួយកុមារ ឱ្យវិវត្តបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ ប៉ុន្តែករណីខ្លះឱសថមួយចំនួន ការផ្លាស់ប្តូរអារហារ ឬការទប់ស្កាត់ពុលបន្ថែម អាចធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើន ។ ប្រសិនបើកុមារមាន សញ្ញាណវិកល ឬហាក់ដូចជាបាត់បង់សមត្ថភាពបញ្ជាបន្តិចម្តងៗ ព្យាយាមទទួលបានជំនួយខុសពីអ្នកជំនាញ ។ **ការទប់ស្កាត់ការអន់បញ្ហា** ត្រូវពិភាក្សាករមូលហេតុផ្សេងៗ ។ ជាពិសេស មើលជំងឺខូចខួរក្បាលបញ្ហាចលនា (ទំព័រ ៣៩) បញ្ហាអន់ (ទំព័រ ១០៥) និងជំងឺវិកលរោគ(ទំព័រ ១០៦) ។

ជំងឺផ្លូវចិត្តបច្ចេកទេស

មនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំថា "បញ្ហាអន់" ជាមួយ "ជំងឺផ្លូវចិត្ត" ។ ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នា ។ មនុស្សដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្ត ជួនកាលអាចមានបញ្ហាធម្មតា ឬបញ្ហាខ្ពស់ និងអាចត្រូវរៀនបានខ្ពស់ ។ ប៉ុន្តែដោយសារតែបទពិសោធន៍នៃជំងឺស្រ្តួស ឬជំងឺមួយចំនួន ដែលមានឥទ្ធិពលដល់ខួរក្បាល ចរិតនេះធ្វើឱ្យក្លាយជាចម្លែក ។ នៅពេលដែលអ្នកអន់បញ្ហាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងវិធីមិនធម្មតា វាក៏ព្រោះតែ គេមិនត្រូវបានរៀនតាមវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រព្រឹត្ត គេត្រូវការការបង្រៀន ។ មនុស្សដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្ត ត្រូវការជំនួយជាពិសេស ប្រហែលជាអ្នកព្យាបាលផ្លូវចិត្ត ឬ "គ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រ" (គ្រូពេទ្យខាងផ្លូវចិត្ត) ។ **អ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្ត ដូចជាមនុស្សដែលមានជំងឺផ្សេងទៀតដែរ ។ ពួកគេតែងតែមិនអាចគ្រប់គ្រងចរិតចម្លែករបស់ខ្លួនបាន ។ យើងមិនត្រូវបន្ទោស ឬដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេឡើយ ប៉ុន្តែផ្តល់ការស្រលាញ់ ការការពារ និងយោគយល់ដល់ពួកគេ ។**

បញ្ហាអន់

នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួន បញ្ហាអន់(mongolism) គឺជាទម្រង់សាមញ្ញបំផុតនៃភាពយឺតបញ្ហា ឬអន់បញ្ហា ។ កុមារទាំងនេះយឺតជាងកុមារផ្សេងទៀត ក្នុងការរៀនប្រើកាយ និងគំនិតរបស់ខ្លួន។ មានសញ្ញា ឬបញ្ហាកាយដែលអាចមើលឃើញមួយចំនួនផងដែរ ។ (ការផ្សំនៃសញ្ញាណផ្សេងៗនេះត្រូវបានហៅថា "Syndrome") ។ កុមារមិនលូតលាស់តាមធម្មតា នៅក្នុងខ្លួនព្រោះតែមានបញ្ហានៅក្នុង "ក្រមួសូម" (សារធាតុនៅក្នុងកោសិកានិមួយៗ របស់សព្វកាយកំណត់ ពីអ្វីដែលកុមារនឹងត្រូវដូច និងមានរូបរាងយ៉ាងដូចម្តេច) ។


ទាំងនេះជា សញ្ញាណនៃការអន់ចុះ (ប៉ុន្តែ មិនមែនគ្រប់ ក្មេងទាំងអស់មានសញ្ញាណដូចគ្នាទាំងអស់ នោះទេ) :

- នៅពេលប្រសូតទារកហាក់ដូចជា ទន់អាឡិក អាឡាក់ និងខ្សោយ ។
- ទារកមិនសូវយំច្រើន
- ទារកយឺតជាងទារកផ្សេងៗទៀតក្នុងអាយុដូចគ្នា ដើម្បីក្រឡាប់ កាន់កាប់វត្ថុ ក្រោកអង្គុយ និយាយ និងដើរ ។
- នៅពេលភ្លាមៗដៃធ្លាក់ចុះ ទារកមិនមានប្រតិកម្ម ដោយលាដៃដូចដែលកុមារធម្មតាមានទេ ។




- ភ្នែកជ្រៀងឡើងលើ ជួនកាលស្រលៀង ឬមើលមិនសូវឃើញ
- ត្រចៀកទាប មាត់តូចចំហរផ្នែកខាងលើមាត់ ខ្ពស់ និងចង្អៀត អណ្តាតល្បឿន ចេញ

- ស្បែកបត់គ្របខាងក្នុងនៃកាច់ ជ្រុងគ្របកភ្នែក
- គ្របកភ្នែកអាចហើមបោង និងក្រហម
- ប្រសិនបើភ្នែកមានរង្វង់សតូច ដូចគ្រប់ខ្សាច់ ។ បញ្ហាទាំងនេះ តែងតែបាត់ទៅវិញនៅអាយុ ១២ខែ ។




- ដៃខ្លី ធំ មានម្រាមខ្លីៗ ។ កូនដៃ អាចរូញ ឬបត់បានតែមួយផ្នត់
- មានខ្សែជ្រៅកាត់បាតដៃ(ជួនកាលក៏កើតមានចំពោះកុមារធម្មតាដែរ)

- ក្បាលខ្លីតូចនិងសំប៉ែតធំនៅខ្នង
- ជួនកាលភ្នាត់ត្រចៀក



- មុខសំប៉ែត
- ច្រមុះតូចរាងសំប៉ែតនៅសងខាង ច្រមុះ



- កខ្លី
- ស្នាមល
- ដៃជើងខ្លី
- អង្គព្យួរអិលមកម្ខាង
- "ប្រអប់ជើងតូច" សំប៉ែត
- ម្រាមមេជើងឆ្ងាយពីម្រាមផ្សេង

សញ្ញាណដែលអាចកើតមានផ្សេងទៀត:

- គន្លាក់កែងដៃ ត្រចៀក និងកែងជើង អាចរលុង និងបត់បែនត្រគាក
- កុមារមួយក្នុងចំណោមកុមារ ៣នាក់មានបញ្ហាបេះដូង
- អាចកើតជំងឺ ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម (មហារីកឈាម)
- ពិនិត្យមើលកុមារធំពីដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់ និងមើល
- មួយក្នុង ១០ ខូចទ្រង់ទ្រាយឆ្អឹងក ដែលអាចភ្លេច និងមានជំងឺសសៃរប្រសាទ នៅក្នុងឆ្អឹងខ្នង ។ ករណីនេះអាចបណ្តាលឱ្យកើនឡើង ដំណើរកំរើកលែងរួចភ្លាមៗ ឬយឺតៗ ឬស្លាប់ភ្លាម ។

ការថែរក្សាកុមារបញ្ហាអន់ និងទំនប់ផ្សេងៗនៃបញ្ហាអន់

បញ្ហាអន់ចំពោះកុមារដែលមានបញ្ហាអន់ អាចមានអាការៈស្រាល មធ្យម ឬខ្លាំង ។ កុមារខ្លះមិនអាចរៀននិយាយបាន ។ កុមារផ្សេងទៀតនិយាយបាន(និងតែងតែចូលចិត្តនិយាយ) ។ កុមារជាច្រើនអាចរៀនអាន និងសរសេរ ។ កុមារភាគច្រើនទាំងនេះរាក់ទាក់ណាស់ និងស្រលាញ់រាប់អាន ហើយប្រព្រឹត្តទុក្ខជាមួយអ្នកដទៃដែលធ្វើល្អនិងគេ ។ បើទោះជាកុមារទាំងនេះមានបញ្ហាអន់ខ្លាំងក៏ដោយ ដោយមានការជួយ និងបង្រៀនល្អ តែងរៀនថែរក្សាតំរូវការមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ និងជួយកិច្ចការធម្មតា ។ ពួកគេអាចរស់នៅត្រឹមត្រូវបានតាមធម្មតា ជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់គេ ។

ជាពិសេសនៅតាមជនបទ ពួកគេអាចរៀនធ្វើកិច្ចការសំខាន់ៗបានជាច្រើន ។ ជួនកាលគេធ្វើកិច្ចការដែលបានល្អ ឬប្រសើរជាងអ្នកដទៃធ្វើ ទៅទៀត ។

ប៉ុន្តែការលូតលាស់កាយ និងបញ្ហាយឺតជាងធម្មតា ។ ដូចនេះឪពុកម្តាយ និងអ្នកដែលថែរក្សាកុមារទាំងនេះត្រូវតែអត់ធ្មត់ជាមួយពួកគេតាំងពីដើមដំបូង ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចធ្វើបាន ដើម្បីជួយកុមារឱ្យលូតលាស់សមត្ថភាពរាងកាយ និងបញ្ហារបស់គេ ។ ដើម្បីជាសំរាំង ឬដោះស្រាយបញ្ហាចរិត ឪពុកម្តាយត្រូវការភាពមិនប្រែប្រួលក្នុងវិធីដែលពួកគេធ្វើលើកូនរបស់ខ្លួន និងក្នុងអ្វីដែលពួកគេរំពឹងពីកូន ។ កុមារត្រូវការការសរសើរ និងការលើកទឹកចិត្តជាច្រើន



នៅក្នុងភូមិមួយ កុមារដែលមានបញ្ហាអន់ម្នាក់ធ្វើកិច្ចការដងទឹកពីស្ទឹង កិច្ចការមានភាពរីករាយ និងមានមោទនៈនឹងធ្វើកិច្ចការនោះ ។

ចំពោះអ្វីដែលគេធ្វើបានល្អ ។

កុមារមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាអន់អាចទៅសាលា ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការជំនួយបន្ថែម ។ ជាការចាំបាច់ ដែលគ្រូយល់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេ និងជួយធ្វើឱ្យកុមារដទៃ ប្រព្រឹត្តិមកលើកុមារបញ្ហាអន់ដោយគោរព ។ ជំនួយបន្ថែមនៅក្នុងសាលាទេ នៅតំបន់ជនបទអាចជួនកាលប្រសើរជាងសំរាប់កុមារ ដែលមានបញ្ហាអន់ ដើម្បីរៀនសូត្រនៅផ្ទះតាមរយៈការជួយគ្រួសារនៅជុំវិញផ្ទះ និងនៅទីវាល ។

ប្រសិនបើកុមារមិនត្រូវបានផ្តល់ការយោគយល់ និង

មានកង្វល់ធំ ៣ នៅក្នុងការថែរក្សាកុមារ ដែលមានបញ្ហាអន់ :

- ១. ជួយកុមារឱ្យលូតលាស់សមត្ថភាពបញ្ហា និងកាយរបស់គេ
- ២. ការពារកុមារកុំឱ្យឆ្លងជំងឺ
- ៣. ការពារ ឬកែលំអការខូចទ្រង់ទ្រាយ

ទាំងនេះយើងនឹងពិភាក្សាពីកង្វះក្រោយ ២ ។ កង្វល់ទី ១ យើងនឹងពិភាក្សានៅមេរៀនបន្ទាប់ ។



កុមារដែលមានបញ្ហាអន់ម្នាក់រៀនដកបង្គោលពីការបង្គោល ។ ក្រោយមកនាងរៀនដាក់បង្គោលនោះវិញ ។ ថតចេញពី ទារក ដែលមានបញ្ហាអន់របស់អ្នក ដោយម៉ាកស៊ី ជេហែនសុន

ចំណាំ : ចំពោះកុមារដែលមានបញ្ហាអន់ ឬបញ្ហាយឺត ចូរច្បាស់ថា ត្រូវអានមេរៀនទាំងអស់ស្តីពីការលូតលាស់របស់កុមារដំបូង និងការសិក្សាពីជំនាញមូលដ្ឋាន ។

ការការពារនៃការឆ្លងជំងឺ


កុមារដែលមានបញ្ហាអន់ ឈឺច្រើនជាងកុមារដទៃ។ ពួកគេអាចកើតជំងឺផ្តាសាយ ជំងឺរលាកទងសួត និងការងាយឆ្លងជំងឺផ្សេងៗទៀត។ ដូចនេះជាការចាំបាច់ត្រូវថែរក្សាពួកគេ ពីការឆ្លងនេះ។



- **ការបំបៅដោះ**កុមារដ៏រាបណាអាចធ្វើទៅបាន។ ទឹកដោះមាន "អង់ទីករ" ដែលជួយកុមារប្រឆាំង និងការឆ្លងជំងឺ។ (ប្រសិនបើគេមិនអាចបំបៅដោះបានល្អចូររឹតទឹកដោះរបស់អ្នកបញ្ចុកគេ ដោយប្រើស្លាបព្រា ឬវិធីដែលអាចធ្វើបាន) ។
- ដូចកុមាររងទៀតដែរ នៅអាយុ ៥ ខែ ចូរផ្តើមផ្តល់ចំណីផ្សេងដល់កុមារ ដូចជា ផ្លែឈើ សណ្តែក ស៊ុត បបរ ប៉ូន្តែ បន្តបំបៅដោះគេផងដែរ។ (ក៏ដូចកុមារដទៃ ចូរឆ្លឹងគេជារៀងរាល់ខែ នៅឯមណ្ឌលសុខភាព ដើម្បីច្បាស់ថាគេមានការលូតលាស់បានល្អ) ។
- **ការចាក់វ៉ាក់សាំង** អាចការពារកុមារពីជំងឺកុមារ។ កុមារបញ្ហាអន់ដែលកើតជំងឺកញ្ជិល ឬក្អកមានអាចកើតជំងឺរលាកទងសួតដោយងាយ។
- **ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកឱសថដំបូង** នៅពេលដែលកុមារឈឺបំពង់ក ឈឺត្រចៀក ក្អកខ្លាំង ចូរយកកុមារទៅជួបគ្រូពេទ្យឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ការទប់ស្កាត់ នៃការខូចខ្លួនខ្លាយទើង និងបញ្ហាដទៃទៀត

- ពិនិត្យកុមារដែលទើបកើតទាំងអស់ រកមើលត្រគាកភ្នាត់ដែលអាចកើតមាន ដើម្បីកែតម្រូវឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅកើត។
- ចំពោះកុមារដែលម្រាម កុំប្រើស្បែកជើងរឹង ដែលបត់ម្រាម ជាការប្រសើរដោយពាក់ស្បែកជើងសំរាប់លេង មេជើងកន្លែកពីគេ មេជើងចូលក្នុង ដូចនេះ ត្រឹមត្រូវ ឬស្បែកជើងទន់ៗឬស្បែកជើងសង្រែក



នៅពេលដែលមេជើងធំកន្លែកចេញខ្លាំង ទីតាំងរបស់វាអាចជូនកាលត្រូវបានកែតម្រូវដោយវះកាត់ ដើម្បីឱ្យស្បែកជើងសមល្មមដោយពុំមានបញ្ហា។

- ប្រសិនបើកុមារមានប្រអប់ជើងសំប៉ែតខ្លាំង ទ្រនាប់ជើងពិសេសអាចជួយបាន។
- ប្រសិនបើសញ្ញាណណាមួយនៃដំណើរកំរើកលែងរួច ឬខ្វះអារម្មណ៍លូតលាស់ ដៃ ជើង ឬសព្វកាយ ចូរទទួលដំបូន្មានពីគ្រូពេទ្យខាងរូបរាងកាយ ឬគ្រូពេទ្យសរសៃប្រសាទ។

ការទប់ស្កាត់ បញ្ហារអន់

កុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ ៨០០ នាក់ កើតមកមានបញ្ហាអន់ និងវាកើតឡើងយ៉ាងសាមញ្ញបំផុត ចំពោះមាតា ដែលមានវ័យក្រោម ២០ ឆ្នាំ និងលើស ៣៥ ឆ្នាំ ។ ស្ត្រីដែលមានវ័យច្រើនជាង ៤០ ឆ្នាំ (ឬក៏លើសពី៧៥ ឆ្នាំ) អាចពិចារណាកុំយកកូនទៀត។ ប្រសិនបើប្តីប្រពន្ធមានកូនបញ្ហាអន់ម្នាក់ ឱកាសនៃការមានកូនដែលមានបញ្ហាអន់ខ្ពស់ជាងធម្មតា (ប្រហែល ១ ក្នុង ៥០) ។

នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនការធ្វើតេស្ត (amniocentesis) អាចត្រូវបានធ្វើប្រហែលជារយៈ ៤ ខែ នៃការមានផ្ទៃពោះដើម្បីមើលថាតើ កុមារនឹងមានជំងឺបញ្ហាអន់ឬទេ? ប្រសិនបើមាន គ្រួសារអាចពិចារណាពន្លត់ចោល (នៅក្នុងសង្គមជាច្រើនការពន្លត់កូនត្រូវបានអនុញ្ញាត) ។

វិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញស្បែក ឬទឹកដុំ

រោគវិកល បណ្តាលមកពីក្រពេញស្បែក គឺជាការពន្លឺទាំងការលូតលាស់នៃពញាណនិងរាងកាយ ដែលកើតមានឡើង នៅពេលខ្លួនរបស់កុមារមិនបានបង្កើត "ទឹកដុំ" ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ ទឹកដុំ ជាសារធាតុមួយឬជា "អ័រម៉ូន" ដែលគ្រប់គ្រងការលូតលាស់របស់កុមារ និងមុខងាររបស់សញ្ញាណ។ បើគ្មានវាអ្វីៗនឹងដំណើរការយឺតទៅៗ។

ទឹកដុំ ត្រូវបានផលិតដោយក្រពេញមួយនៅពីមុខក។ ដើម្បីផលិត ទឹកដុំ ក្រពេញត្រូវការអ៊ុយត្រូ។ មនុស្សភាគច្រើនទទួលបាន សារធាតុអ៊ុយត្រូគ្រប់គ្រាន់ពីទឹក និងអាហារ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ខ្លះ ជាពិសេសនៅតំបន់ភ្នំ ដី ទឹក និងអាហារមានអ៊ុយត្រូតិចតួច។ ក្នុងបំណងដើម្បីទទួលបានអ៊ុយត្រូច្រើនក្រពេញ ទឹកដុំ ជួនកាលលូតលាស់យ៉ាងធំ ដែលបង្កើតអោយមានការហើមប៉ោង ដែលត្រូវបានគេហៅថាជំងឺពកក។



នៅកន្លែងដែលមានអ៊ុយត្រូតិចតួចនឹងមានពលរដ្ឋច្រើនកើតជំងឺពកក វិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញ ទឹកដុំ ជារឿងធម្មតា។ នៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នាទាំងនេះ កុមារជាច្រើនតែងតែមានការលំបាកខាងការស្តាប់ ឬអ្វីដែលបង្កប់បញ្ហា។ ទោះជាគេមិនបានបង្ហាញពីសញ្ញាធម្មតានៃវិកលរោគនេះក៏ដោយ ក៏មូលហេតុប្រហែលជាដូចគ្នា។ ម្តងម្កាលនៅតំបន់ដែលជំងឺពកកមិនធម្មតា វិកលរោគកើតឡើង ដោយហេតុផលផ្សេង ជាជាងការខ្វះជាតិអ៊ុយត្រូ។

សញ្ញាណ ខាងក្រោម យើងបង្ហាញពីសញ្ញាណធម្មតាខ្លះៗ នៃជំងឺវិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញទឹកដុំ និងប្រៀបធៀបសញ្ញាណទាំងនោះជាមួយជំងឺបញ្ហាអន់ ដែលវិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញ ទឹកដុំ ផ្សំឡើងតាមវិធីផ្សេងៗ។ វាពិបាកនឹងប្រាប់ថា តើកុមារដែលទើបតែកើតមានវិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញទឹកដុំឬអត់។ កុមារតែងតែកើតមកធំ ហើយមិនលូតលាស់តាមធម្មតា។ ទារកអាចពិបាកបំបៅ ឬដកដង្ហើមដោយពិបាក ឬធ្វើសំលេងព្រោះតែអណ្តាតធំ។ កុមារធ្វើចលនា និងយំតិចតួច។ នៅអាយុ ៣ ទៅ ៦ ខែ ម្តាយតែងតែបារម្ភ ព្រោះកូនមើលទៅហាក់ដូចជាស្ងួត ចាប់អារម្មណ៍ពីអ្វីៗតិចតួច ដេកច្រើន និងយឺតក្នុងការលូតលាស់។

<p>សញ្ញានៃរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញ ទឹកដុំ</p>  <ul style="list-style-type: none"> • សក់ធ្លាក់លើថ្ពាល់ • គ្របកភ្នែកប៉ោង • ខ្នងច្រមុះត្របែតរវាងភ្នែក • មុខ ដៃ ជើង ប៉ោង • ហើមប៉ោងនៅទីនេះ • លូតលាស់យឺត ទាបជាងវ័យកើនឡើង • ទល់លាមកធ្ងន់ធ្ងរ (អាចមិនបន្ទាបមួយថ្ងៃ) • ឧស្សាន៍ស្តាប់មិនលឺ • សីតុណ្ហភាពក្រោមធម្មតា • ស្បែកក្រាស់ ស្ងួត ត្រជាក់ 	<p>សញ្ញាណដែលឃើញមានចំពោះទាំងវិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញទឹកដុំ និងបញ្ហាអន់</p> <ul style="list-style-type: none"> • ការលូតលាស់បញ្ហា និងកាយយឺត • ភ្នែកចែកពីគ្នាយ៉ាងទូលាយ • មុខមូល មើលទៅស្ងួតៗ • អណ្តាតបានចេញ និងមាត់ចំបារ • ក និងអវ័យវៈខ្លី • ប្រអប់ដៃខ្លីធំ • ពោះធំ និងអែន • តែងតែកើតក្នុងលូននៃផ្សិត 	<p>សញ្ញាណ វិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញទឹកដុំ និងបញ្ហាអន់ (ដែលមានសារៈបំផុតក្នុងការប្រាប់វាពីវិកលរោគ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • សក់ចាប់ផ្តើមខ្ពស់ពីលើថ្ពាល់ • ភ្នែកសំលាង ដោយគ្របកភ្នែកបត់ពីក្នុងកាច់ជ្រុង <p>ចំពោះសញ្ញាណផ្សេងទៀត ចូរមើលទំព័រ ២៧៩</p> 
---	--	---

អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ការព្យាបាលដំបូងនិងជាបន្តបន្ទាប់ ដោយប្រើឱសថទឹកដុំ ជួយកែលំអការលូតលាស់លក្ខណៈរូបរាង និងជួនកាលអាចកាត់បន្ថយ ឬការពារការអន់បញ្ហា។ សំរាប់លទ្ធផលដែលប្រសើរ ការព្យាបាលគួរតែចាប់ផ្តើមអំឡុងពេលខែដំបូងនៃជីវិត។ ចំពោះមូលហេតុនេះ ដំរាបណាអ្នកសង្ស័យថាទារកអាច កើតវិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញទឹកដុំ ចូរទៅទទួលដំបូន្មានឧសថដែលមានជំនាញ។

ដើម្បីជួយកុមារឱ្យលូតលាស់ពញាណនិងរាងកាយ និងរៀនដំណើរការមូលដ្ឋាន និងប្រើគំនិតដែលអាចជួយឆ្លើយតប និងតំរូវការរបស់កុមារ។ ដោយមានការព្យាបាលដំបូង និងការសិក្សាណែនាំ កុមារជាច្រើនដែលមានវិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញទឹកដុំអាចរៀនថែរក្សាខ្លួនគេ និងធ្វើកិច្ចការធម្មតា ប៉ុន្តែសំខាន់សំរាប់នៅក្នុងសហគមន៍។ សំរាប់គំនិតស្តីពីការគ្រប់គ្រងការទល់លាមក។

ការទប់ស្កាត់ នៅក្នុងតំបន់ដែលជំងឺពកកកើតមានជាធម្មតា វិកលរោគបណ្តាលមកពីក្រពេញទឹកដុំ (និងជំងឺផ្លូវ) អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើន ដោយការលើកទឹកចិត្តអ្នករាល់គ្នាអោយប្រើអំបិលដែលមានជាតិអ៊ុយត្រូ។