

វ៉ាក់សាំងអាចបង្ការជំងឺ

វ៉ាក់សាំងអាចបង្ការជំងឺជាច្រើនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានជំងឺ ឬថែមទាំងស្លាប់ទៀតផង។ វ៉ាក់សាំងពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសំរាប់រាងកាយដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការប្រយុទ្ធបណ្តេញមេរោគនិងជំងឺផ្សេងៗ ដើម្បីឲ្យរាងកាយទទួលបានសុខភាពល្អឡើងវិញ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធភាពសំរាប់មានលក្ខណៈរួចរាល់ និងរឹងមាំ នោះវាឆាប់ស្គាល់ពីការគំរាមកំហែងនានាដល់សុខភាព ហើយដឹងពីរបៀបប្រយុទ្ធជាមួយវាជាស្រេច។ វ៉ាក់សាំងមិនធ្វើឱ្យអ្នកមានជំងឺទេ។

តើវ៉ាក់សាំងធ្វើការដោយរបៀបណា? វ៉ាក់សាំងត្រូវបានផលិតឡើងដោយមេរោគស្រាលឬអសកម្ម ហើយវត្តមានរបស់វា បង្ហាញពីរបៀបបញ្ឈប់មេរោគស្រដៀងគ្នានាពេលអនាគត មុនពេលមេរោគធ្វើឲ្យមនុស្សមានជំងឺ។ វិធីដែលរាងកាយបង្កើតប្រព័ន្ធការពារនេះ គឺតាមរយៈការបង្កើតអង្គបដិបក្ខជាតិលាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺប្រកបដោយជោគជ័យ។ អង្គបដិបក្ខទាំងនេះ ការពារអ្នកនិងអ្នកដទៃដែលរស់នៅជុំវិញអ្នក ពីមេរោគដែលបង្កជំងឺ។

ទារកកើតមកជាមួយនឹងអង្គបដិបក្ខមួយចំនួនដែលពួកគេត្រូវការ ដែលវាមកដោយផ្ទាល់ពីម្តាយរបស់ពួកគេ។ នៅពេលម្តាយបំបៅដោះកូន វាពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសំរាប់ទារកថែមទៀត។ វ៉ាក់សាំង ស្ថាបនាប្រព័ន្ធភាពសំរាប់ទារកនៅពេលដែលពួកគេធំឡើងៗ។ ដូចដែលអាហារដ៏ជាតិល្អ ជួយឱ្យរាងកាយរបស់ទារកលូតលាស់ដែរ វ៉ាក់សាំងជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពសំរាប់លូតលាស់ដូចគ្នា។

វ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាព។ ជំងឺមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែសម្លាប់មនុស្ស ឬធ្វើឲ្យពិការ ដូចជាជំងឺអុតតូច ជាដើម គឺត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុង ហើយយើងមិនត្រូវការវ៉ាក់សាំងសម្រាប់វាទៀតឡើយ។

ជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលវ៉ាក់សាំងចង់បង្ក្រាប ឥឡូវមិនសូវឃើញមានទៀតទេ។ ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ទារក និងកុមារគ្រប់រូប និងមនុស្សពេញវ័យផងដែរតាមចាំបាច់ អាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យជំងឺជាច្រើន ឆ្លងរាលដាល ឬវិលត្រឡប់មកវិញ។





វ៉ាក់សាំង ការពារបុគ្គលដែល បានទទួលវា ហើយវាការពារ អ្នកដទៃថែមទៀត នៅពេល ដែលមានមនុស្សគ្រប់ ចំនួន បានទទួលវ៉ាក់សាំង។ ប្រសិនបើជំងឺមួយ មិនអាចរក ឃើញមនុស្សថ្មីដែលមិនបាន ទទួលវ៉ាក់សាំងទេ នោះវាក៏ មិនអាចឆ្លងរាលដាលបានទេ ។ យូរៗទៅ នៅពេលមាន មនុស្សកាន់តែច្រើន ទទួល បានវ៉ាក់សាំង នោះករណី ជំងឺក៏មានកាន់តែតិចដែរ។

ចំនួនមានច្រើន ធ្វើឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំង! នៅពេលមនុស្សភាគច្រើនបានទទួល វ៉ាក់សាំង នោះភាពស៊ាំនឹងជំងឺរបស់ពួកគេ អាចជួយការពារអ្នកដទៃទៀតដែលនៅក្នុងពេក ឬមានជំងឺធ្ងន់ពេក ដែលមិនអាចទទួលវ៉ាក់សាំងបាន។ នេះហៅថា ភាពស៊ាំជាក្រុម។

រៀនអំពីវ៉ាក់សាំង និងហេតុអ្វីទើបយើងត្រូវការវា

វ៉ាក់សាំងបង្ការកុមារពីជំងឺគ្រោះថ្នាក់ ជាច្រើន ដូចជាក្អកមាន់ តេតាណូស រលាកសួត កញ្ជ្រើល រលាកថ្លើមប្រភេទ បេ របេង និងជំងឺរាកដែលបង្កដោយវីរុស rotavirus ។ វ៉ាក់សាំង HPV អាចបង្ការ មហារីកមួយចំនួន។ ប្រសិនបើកូនរបស់ អ្នក បានទទួលវ៉ាក់សាំង ពួកគេនឹងត្រូវ បានការពារពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

ប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំមិនដែល ឮថាមានវណ្ណម្នាក់មានជំងឺ ស្លឹតដៃដើងនោះទេ។

នៅពេលខ្ញុំនៅតូច វាជា បញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ សព្វថ្ងៃ គ្មានជំងឺស្លឹតដៃដើងទៀតទេ ព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែ បានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការ។ ហើយវាមានប្រសិទ្ធភាព!



ជាធម្មតា វ៉ាក់សាំងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទារកនិងកុមារ ហើយ ប្រទេសនីមួយៗមានកាលវិភាគផ្ទាល់ខ្លួន ដែលប្រាប់អំពីពេលវេលាដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យ ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលបានកំណត់ពេលវេលាជួបជាមួយទារកនិងកុមារ ដើម្បីឱ្យប្រាកដថាពួកគេកំពុង លូតលាស់បានល្អ និងដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងចាំបាច់ផ្សេងៗដើម្បីរក្សាសុខភាពដ៏ល្អ។

វ៉ាក់សាំងជាច្រើនត្រូវបានផ្តល់ឲ្យច្រើនដង ដើម្បីជួយដល់រាងកាយរបស់យើងឲ្យពង្រឹងកម្លាំងប្រឆាំងនឹង ជំងឺមួយចំនួន។ បន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងសំខាន់ៗ ឬវ៉ាក់សាំងដូចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់(ជាសេរី), ឧទាហរណ៍ ចាក់ ៣ដងក្នុងរយៈពេល ៦ខែ, ពួកគេក៏នៅតែអាចត្រូវការវ៉ាក់សាំងរំពូកមួយឬច្រើនដង នៅពេលក្រោយទៀត។ នៅពេលដែលប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង ថយចុះ នោះការចាក់វ៉ាក់សាំងរំពូក គឺជា ការរំពូកដល់រាងកាយអំពីរបៀបប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ។

? ចុះបើកូនរបស់ខ្ញុំឈឺនៅចំថ្ងៃណាត់ទទួលវ៉ាក់សាំង?



➔ វ៉ាក់សាំងអាចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យនរណាម្នាក់ដែលមានជំងឺផ្តាសាយ ឬជំងឺស្រាល។ ប្រសិនបើកុមារមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ បុគ្គលិកសុខាភិបាលនឹងប្រាប់ក្រុមគ្រួសារថាតើគួរពន្យារពេលផ្តល់វ៉ាក់សាំងដែរឬទេ។ នៅពេលដែលអ្នកដទៃនៅក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍ បានទទួលវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នា នោះវានឹងជួយបង្ការជំងឺចំពោះអ្នកដែលមិនអាចទទួលវ៉ាក់សាំងបាន។

? តើវ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ?



➔ វ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាព។ វាមិនធ្វើឲ្យមានជំងឺទេ។ វ៉ាក់សាំងខ្លះអាចបណ្តាលឲ្យរមាស់ ឬគ្រុនក្តៅបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្តែវានឹងបាត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ប្រសិនបើអ្នកឮពាក្យច្រាមអាវាមដែលថាវ៉ាក់សាំងមិនមានសុវត្ថិភាពទេ ចូរនិយាយជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលអ្នកជឿជាក់ ដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបាន។

? តើវ៉ាក់សាំងគឺសម្រាប់តែកុមារមែនឬទេ?



➔ កុមារទាំងអស់ត្រូវការវ៉ាក់សាំង ប៉ុន្តែតម្រូវការវ៉ាក់សាំងមិនបញ្ចប់បន្ទាប់ពីកុមារភាពនោះទេ។ ចំពោះជំងឺខ្លះ កុមារធំនិងមនុស្សពេញវ័យនឹងត្រូវការថ្នាំចាក់បន្ថែម ដែលហៅថា "វ៉ាក់សាំងរំព្រក" ដើម្បីរក្សាសមត្ថភាពការពារ។ នេះដោយសារតែយូរៗទៅ ប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនថយចុះ។ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ក៏ត្រូវបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ម្តាយនិងទារកផងដែរ។ មនុស្សវ័យចំណាស់ ឬអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ អាចនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារពីជំងឺដូចជា គ្រុនផ្តាសាយដែលរាងកាយរបស់ពួកគាត់ទប់ទល់មិនបានល្អ។

? ចំនួននិងប្រភេទនៃវ៉ាក់សាំងបានប្រែប្រួល ធៀបនឹងកូនដំបូងរបស់ខ្ញុំ។ ហេតុអ្វីបានជាដូច្នោះ?



➔ ចំពោះជំងឺមួយចំនួន អាចមានក្រុមហ៊ុនឱសថជាច្រើនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព។ វ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាចនឹងមានកាលវិភាគផ្សេងគ្នា។ ដូច្នោះប្រសិនបើប្រទេសពីរ ប្រើម៉ាកវ៉ាក់សាំងខុសគ្នា ឬប្រទេសតែមួយផ្លាស់ប្តូរពីវ៉ាក់សាំងមួយ ទៅវ៉ាក់សាំងមួយទៀត នោះកាលវិភាគនៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំង ក៏អាចនឹងផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ ការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតកើតឡើងនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងថ្មីត្រូវបានផលិតឡើង ឬលែងត្រូវការវ៉ាក់សាំងចាស់។

នរណាខ្លះត្រូវការវ៉ាក់សាំង និងត្រូវការពេលណា?

នៅប្រទេសនានា និងជួនកាលស្រុកនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសនោះ មានកាលវិភាគផ្តល់ថ្នាំបង្ការខុសៗគ្នា៖

- វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនត្រូវបានផ្តល់ឲ្យមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នា ពោលគឺទារក កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ។ កុមារធំឬមនុស្សពេញវ័យដែលខកខានទទួលវ៉ាក់សាំងដែលផ្តល់ឱ្យក្នុងពេលជាទារក នៅតែអាចទទួលវា នៅពេលក្រោយ។
- វ៉ាក់សាំងខ្លះមានប្រយោជន៍តែនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យតែចំពោះមនុស្ស ដែលរស់នៅ ឬទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះប៉ុណ្ណោះ។
- វ៉ាក់សាំងខ្លះមិនមានភាពចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើចំពោះក្រុម មួយចំនួន ដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ បុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬមនុស្សវ័យចំណាស់។
- នៅពេលដែលវាជាជំងឺថ្មីនៅក្នុងតំបន់មួយ ជាធម្មតាអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវការទទួលវ៉ាក់សាំង។



ក្នុងវប្បធម៌របស់ខ្ញុំ មនុស្សគ្រប់រូបគឺជាគ្រួសារ។ ដោយ ការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកូនៗរបស់យើង គឺយើងការពារ មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយក៏ជួយដល់ មនុស្សនិរន្តរ៍ក្រោយផងដែរ។

វ៉ាក់សាំងដែលផ្តល់ជាប្រចាំ ការពារទារកនិងកុមារ

បុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្តល់ការពិនិត្យដល់ទារកជាច្រើនដងក្នុងអំឡុងឆ្នាំដំបូងនៃជីវិត។ នេះក៏ជាពេលដែល ពួកគេផ្តល់វ៉ាក់សាំងស្ទើរតែគ្រប់មុខផងដែរ។ វ៉ាក់សាំងមួយណា និងត្រូវផ្តល់នៅពេលណា គឺអាស្រ័យលើ គោលការណ៍របស់កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

ដើម្បីរក្សាទារកនិងកុមារឲ្យមានសុខភាព ល្អ វ៉ាក់សាំងមានសារសំខាន់ខ្លាំង ណាស់ ប៉ុន្តែស្ថានភាពរស់នៅដែលបង្ការ ជំងឺផ្សេងៗ ក៏សំខាន់ដូចគ្នា។ ទឹកស្អាត អនាម័យល្អ ការបំបៅដោយទឹកដោះម្តាយ យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល ៦ខែ ដំបូងនៃជីវិត និងអាហារូបត្ថម្ភល្អ នឹង បង្ការជំងឺបានយ៉ាងច្រើន។ (សូមមើល ជំពូក ទឹកស្អាត និងអនាម័យ៖ គន្លឹះដើម្បី ថែរក្សាសុខភាព និង អាហារល្អធ្វើឲ្យមាន សុខភាពល្អ) ។




ទារកកំពុងរំលូតលាស់ យ៉ាងល្អ។ ថ្ងៃនេះយើងនឹង ផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យនាង ដើម្បី រក្សាសុខភាពល្អរបស់គាត់។

វ៉ាក់សាំង និងវ៉ាក់សាំងព្រែក ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យមនុស្សពេញវ័យ នៅពេលដែលពួកគេត្រូវការវ៉ាក់សាំងមួយ ដួសទៀតបន្ទាប់ពីកុមារភាព ដើម្បីឲ្យការការពារមានរយៈពេលយូរ ឬដោយសារតែពួកគេមិនបានទទួល វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួននៅពេលជាទារក។

កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ បានផ្តល់ការណែនាំអំពីកាលវិភាគសម្រាប់ផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ទារកនិងកុមារ។ កាលវិភាគនោះបង្ហាញថាតើវ៉ាក់សាំងណាដែលត្រូវផ្តល់រួមគ្នា និងនៅអាយុប៉ុន្មាន។ នៅពេលវ៉ាក់សាំង ២មុខមិនអាចផ្តល់រួមគ្នាទេ ជាញឹកញាប់គឺដោយសារតែវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពល្អនៅពេលបញ្ចូលទៅក្នុងរាងកាយក្នុងពេលតែមួយ។

តើកុមារនៅក្នុងប្រទេសយើងត្រូវការវ៉ាក់សាំងនៅពេលណា?

នៅពេលកើត		វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរបេង (BCG) វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេ (HepB)
អាយុ ២ខែ	ដូសទី១៖	វ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនស្ទិតដៃជើង វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺខាន់ស្លាក់ ក្អកមាន់ តេតាណូស
អាយុ ៤ខែ	ដូសទី២៖	
អាយុ ៦ខែ	ដូសទី៣៖	វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ rotavirus វ៉ាក់សាំងបង្ការមេរោគភ្លើម្នែក
អាយុ ៩-១២ខែ		វ៉ាក់សាំង MMR លើកទី១ វ៉ាក់សាំងរំលែកការពារមេរោគភ្លើម្នែក
អាយុ ១៨ខែ		វ៉ាក់សាំង MMR លើកទី២ វ៉ាក់សាំងរំលែកការពារគ្រុនស្ទិតដៃជើង
អាយុ ៤-៦ឆ្នាំ		វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺខាន់ស្លាក់ ក្អកមាន់ តេតាណូស វ៉ាក់សាំងរំលែកលើកទី២ ការពារគ្រុនស្ទិតដៃជើង
អាយុ ៩-១១ឆ្នាំ		វ៉ាក់សាំងរំលែកការពារជំងឺតេតាណូស ដូសទី២ នៃវ៉ាក់សាំងបង្ការមហារីកមាត់ស្បូន (HPV)



ជាញឹកញាប់ កាលវិភាគផ្តល់វ៉ាក់សាំងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងមួយនេះ បើទោះជាអាយុនៃក្រុមវ៉ាក់សាំងនីមួយៗមានភាពខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយក៏ដោយ។ ម្យ៉ាងទៀត មិនមែនគ្រប់ប្រទេសសុទ្ធតែប្រើវ៉ាក់សាំងរួមគ្នាដូចគ្នានោះទេ ហើយមិនមែនវ៉ាក់សាំងទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការនៅគ្រប់ប្រទេសនោះដែរ។ ចូរស្វែងរកព័ត៌មានពីកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ថាតើវ៉ាក់សាំងអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

វ៉ាក់សាំង និងមេរោគ HIV

ជាទូទៅ ទារកនិងមនុស្សពេញវ័យដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ត្រូវការវ៉ាក់សាំងដូចគ្នានឹងមនុស្សដទៃដែរ។ ក្នុងករណីខ្លះ កុមារមនុស្សពេញវ័យដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អាចនឹងត្រូវការដូសបន្ថែម ដូចជា វ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ជ្រើល ជាដើម។

ចំពោះវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនតូច (BCG, MMR, OPV), ត្រូវប្រាកដថាសុខភាពមានស្ថេរភាព និងបានចាប់ផ្ដើមការព្យាបាលមេរោគអេដស៍ មុននឹងចាប់ផ្ដើមផ្តល់វ៉ាក់សាំង។ ការព្យាបាលមេរោគអេដស៍ ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយ កាន់តែរឹងមាំ ហើយបែបនេះធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរ។

ចំពោះវ៉ាក់សាំង BCG វាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្តល់ឲ្យនៅពេលកើត ទោះបីជាម្តាយមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ក៏ដោយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី បើកុមារជាកុមារធំ និងផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នោះសូមព្យាបាលមេរោគអេដស៍ជាមុនសិន។

វ៉ាក់សាំង និងផ្ទៃពោះស្រ្តី

វ៉ាក់សាំងការពារសុខភាពរបស់ម្តាយនិងទារកដែលកំពុងលូតលាស់។ ម្យ៉ាងទៀត ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ បញ្ជូនអង្គបដិបក្ខពីវ៉ាក់សាំងទាំងឡាយ ទៅឲ្យកូនដែលមិនទាន់កើត ហើយវាជួយការពារទារកនៅក្រោយពេលកើត។ ទារកទើបនឹងកើត គឺមានភាពក្មេងពេកក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍បួនដំបូងៗនៃជីវិត។



ការទទួលបានវ៉ាក់សាំងពេញលេញក្នុងវ័យក្មេង មានន័យថាផ្ទៃពោះរបស់ស្រ្តី កាន់តែមានសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតអំពីការមានផ្ទៃពោះ ចូរពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីឱ្យប្រាកដថាគ្រប់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក សុទ្ធតែទាន់សម័យ។

ចូរចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយឪពុកម្តាយរបស់ក្មេងស្រីនានា និងស្រ្តីដែលមានផ្ទៃពោះ៖

- ការផ្តល់វ៉ាក់សាំង មិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ស្រ្តីក្នុងការមានផ្ទៃពោះនោះទេ។
- វ៉ាក់សាំងភាគច្រើនមានសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។
- នៅពេលក្មេងស្រីទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងអស់របស់ខ្លួនក្នុងវ័យកុមារ នោះគាត់នឹងត្រូវការវ៉ាក់សាំងតិចតួច ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺស្នូត គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយដែលបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងមានប្រយោជន៍ក្នុងការផ្តល់ឲ្យកុមារីមុនពេលមានផ្ទៃពោះដោយសារតែជំងឺស្នូតលើស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ទារក។
- មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការវ៉ាក់សាំងរំពូកបង្ការជំងឺតេតាណូស ជាច្រើនដង ក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំ ដែលអាចជាវ៉ាក់សាំងដាច់តែឯង ឬជាផ្នែកមួយនៃវ៉ាក់សាំងរួមបញ្ចូលគ្នា។ ប្រសិនបើស្រ្តីម្នាក់មិនទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺតេតាណូសនាពេលថ្មីៗទេ នោះគាត់នឹងត្រូវការវ៉ាក់សាំងនេះក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ វ៉ាក់សាំងនេះ ការពារទារកទើបកើត ពីមេរោគតេតាណូសដ៏គ្រោះថ្នាក់ ដែលអាចកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មិនស្ទើរល្អក្នុងអំឡុងពេលសម្រាលកូន។
- នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចនឹងផ្តល់អនុសាសន៍វ៉ាក់សាំងផ្សេងក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ដូចជាវ៉ាក់សាំងបង្ការក្អកក្អាត ឬវ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនផ្តាសាយជាដើម។

វ៉ាក់សាំងខ្លះត្រូវបានជៀសវាងក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ដូចជាវ៉ាក់សាំង BCG ឬវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រើល។ នៅពេលផ្តល់វ៉ាក់សាំង សូមសួរស្រ្តីជាមុនសិន ថាតើគាត់មានផ្ទៃពោះដែរឬទេ។

កត់ត្រាទុក

សូមរក្សាទុកប័ណ្ណផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ឬឯកសារដែលបង្ហាញឈ្មោះនិងកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ។ ជារឿយៗកុមារត្រូវការប័ណ្ណទាំងនេះដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន ហើយមនុស្សពេញវ័យត្រូវការវាសម្រាប់ការងារ ធ្វើដំណើរ និងដើម្បីបង្ហាញដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនូវវ៉ាក់សាំងដែលពួកគេបានទទួល និងអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេត្រូវការ។ ប្រសិនបើពួកគេមិនមានប័ណ្ណទាំងនេះនៅគ្លីនិករបស់អ្នកទេ សូមកត់ត្រាទុកខ្លួនឯង ហើយឲ្យអ្នកដែលផ្តល់វ៉ាក់សាំង បំពេញព័ត៌មាននិងចុះហត្ថលេខា។

ប័ណ្ណផ្តល់ថ្នាំបង្ការ			
មោះ ៖ មីវ៉ា កុមារ			
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖ ១០ កុម្ភៈ ២០១៩			
ស្ថានភាពជំងឺ ឬអាល់ឡេស៊ី:			
ស្ថានភាពជំងឺ ឬអាល់ឡេស៊ី:	រំលងខ្លួន	ផ្តល់ដោយ	រំលងខ្លួន
BCG	ផ្តល់ដោយ	មណ្ឌលសុខភាព	
bOPV polio	ផ្តល់ដោយ	មណ្ឌលសុខភាព	៣០ មីនា
Hep B	ផ្តល់ដោយ	មណ្ឌលសុខភាព	៣០ មីនា
DPT-Hib-HepB	៣០ មីនា ១៩	មណ្ឌលសុខភាព	៣០ មេសា
OPV polio	៣០ មីនា ១៩	មណ្ឌលសុខភាព	៣០ មេសា
Rotavirus	៣០ មីនា ១៩	មណ្ឌលសុខភាព	៣០ មេសា

វ៉ាក់សាំងដែលផ្តល់ជាញឹកញាប់

នៅប្រទេសភាគច្រើន មានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារពី៖

- ជំងឺរបេង
- ជំងឺតេតាណូស
- ជំងឺខាន់ស្លាក់
- ជំងឺក្អកមាត់
- ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេ
- បាក់តេរី Haemophilus influenza ប្រភេទបេ ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺជាច្រើន
- ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើង
- មេរោគ Rotavirus ដែលជាមូលហេតុនៃជំងឺរាកលើទារកនិងកុមារតូច
- មេរោគ ភ្លើម្នូក ដែលបង្កជាជំងឺរលាកសួត និងជំងឺផ្សេងទៀត
- ជំងឺកញ្ជ្រើល
- ជំងឺស្នូច
- មេរោគ Human papillomavirus (HPV) ដែលបង្កជាមហារីកមាត់ស្បូន

នៅពេលចាំបាច់ មានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារពី៖

- ជំងឺអាសន្នរោគ
- ជំងឺដែលបង្កដោយបាក់តេរី meningococcus
- ជំងឺគ្រុនលៀង
- ជំងឺរលាកខួរក្បាល ជេអ៊ី
- ជំងឺរលាកខួរក្បាលបណ្តាលមកពីចៃ
- ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទអា
- ជំងឺអុតស្វាយ (varicella)
- ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ
- ជំងឺគ្រុនពោះរៀន
- ជំងឺផ្លែឆ្នួត

វ៉ាក់សាំង BCG ការពារជំងឺរបេង	
<p>វ៉ាក់សាំង BCG គឺថ្នាំចាក់ដែលចូលទៅក្រោមស្បែកតែបន្តិចៗ វាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកំណើត។</p> <ul style="list-style-type: none"> ប្រសិនបើមានវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងគ្រួសារ មានជំងឺរបេង ហើយកុមារមិនដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង BCG ទេ សូមចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យពួកគេឱ្យបានឆាប់បំផុត។ មិនត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំង BCG ឱ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះទេ។ ទារកដែលកើតពីម្តាយដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អាចទទួលវ៉ាក់សាំង BCG នៅពេលកើតបាន។ ចំពោះអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍រួចហើយ សូមចាប់ផ្តើមព្យាបាលមេរោគអេដស៍ មុននឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំង BCG ។ 	<p>ជំងឺរបេងគឺជាការបង្ករោគដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលជាទូទៅស្ថិតនៅក្នុងសួត ហើយគេអាចព្យាបាលវាឱ្យជាសះស្បើយបានដោយថ្នាំពេទ្យ។ ប្រសិនបើមិនព្យាបាលទេ ជំងឺរបេងបំផ្លាញសួតបន្តិចម្តងៗ ហើយធ្វើឱ្យអ្នកជំងឺដកដង្ហើមមិនបាន។ វ៉ាក់សាំង BCG ជួយបង្ការប្រភេទគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃជំងឺរបេង និងជួយឱ្យរាងកាយសំរាំងនឹងការបង្ករោគផ្សេងៗទៀតផងដែរ។</p>



វ៉ាក់សាំងរួមបញ្ចូលគ្នា (ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការចាក់ថ្នាំ) វ៉ាក់សាំង Pentavalent គឺជាវ៉ាក់សាំងរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីការពារពីជំងឺ ៥ មុខ ក្នុងការចាក់តែ ១ ម្តងប៉ុណ្ណោះ ៖ ជំងឺខាន់ស្លាក់, ជំងឺក្អកមាត់, ជំងឺតេតាណូស, ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេ, ជំងឺរលាកសួត-រលាកស្រោមខួរក្បាលដោយហ៊ិប។ វ៉ាក់សាំង Hexavalent (ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីការពារពីជំងឺ ៦ មុខ ៖ ៥ មុខដូចគ្នានឹងវ៉ាក់សាំង pentavalent បូកបន្ថែមជំងឺគ្រុនស្វិតដៃដើម។

វ៉ាក់សាំង DPT (ឬ DTaP, Tdap) ការពារពីជំងឺខាន់ស្លាក់ ជំងឺក្អកមាត់ ជំងឺតេតាណូស	
<p>វ៉ាក់សាំង DPT ការពារពីជំងឺ ៣ មុខ ។ វ៉ាក់សាំង pentavalent និង hexavalent រួមបញ្ចូលវ៉ាក់សាំង DPT ។ មកដល់អាយុ ៦ ខែ ទារកនឹងបានទទួលវ៉ាក់សាំង ៣ ដង។</p> <ul style="list-style-type: none"> ជាធម្មតា កុមារធំៗនឹងទទួលវ៉ាក់សាំងរំពូក DTP ចំនួន ៣ ដង ឬក៏វ៉ាក់សាំងរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្ការជំងឺខាន់ស្លាក់ និងជំងឺតេតាណូស (Td, Dt)។ វ៉ាក់សាំង DPT ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ជួយការពារដល់ទារក។ ការទទួលបានវ៉ាក់សាំង DPT គ្រប់ ៦ ដួស(៣ ដងដំបូង និងរំពូក ៣ ដងទៀត) ផ្តល់ការការពារពីជំងឺតេតាណូសអស់ជាច្រើនទសវត្សមកហើយ។ វ៉ាក់សាំងរំពូកតេតាណូស (TT) គឺជាការចាំបាច់ ប្រសិនបើកុមារមិនបានទទួលបង្គាប់ ៣ ដួស ឬប្រសិនបើអ្នកមានរបួសជ្រៅ ឬកខ្វក់។ 	<p>ជំងឺខាន់ស្លាក់ ភាគច្រើនប៉ះពាល់ដល់កុមារហើយអាចហើមបំពង់កយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឱ្យមិនអាចដកដង្ហើមបាន។</p> <p>ជំងឺក្អកមាត់បណ្តាលឱ្យក្អកយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើអោយពិបាកដកដង្ហើម។ បែបនេះមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទារក។</p> <p>ជំងឺតេតាណូសអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចឆ្លងវាតាមរយៈការមុតដាច់ ឬរបួស។ ទារកទើបនឹងកើតអាចមានជំងឺតេតាណូស ប្រសិនបើម្តាយមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងទេ។</p>

វ៉ាក់សាំង HepB (ឬ HBV) ការពារពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេ	
<p>មកដល់អាយុ ៦ ខែ ទារកបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង បន្តបន្ទាប់ ៣ ឬ ៤ ដង។</p> <ul style="list-style-type: none"> វ៉ាក់សាំងលើកទី១ ត្រូវបានផ្តល់នៅពេលកើត ហើយវ៉ាក់សាំងបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងអំឡុងអាយុ ៦ ខែ, ដែលអាចជាវ៉ាក់សាំង DPT ជាបន្តបន្ទាប់ ឬមួយជាវ៉ាក់សាំង pentavalent ឬ hexavalent ។ សូមផ្តល់វ៉ាក់សាំងឱ្យកុមារធំៗ និងមនុស្សពេញវ័យ នូវវ៉ាក់សាំង HepB ចំនួន ៣ ដង ប្រសិនបើពួកគេមិនបានទទួលវានៅពេលជាទារកទេ។ 	<p>ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេ បណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ និងជូនកាលជាមហារីកថ្លើម។ វាអាចចម្លងពីម្តាយទៅទារកក្នុងអំឡុងពេលកើត ឬរវាងមនុស្ស២ នាក់តាមរយៈការរួមភេទ ឬម្តុលមិនស្អាត។</p>

<p>វ៉ាក់សាំង Hib ការពារពីបាក់តេរី haemophilus influenza ប្រភេទបេ</p>	
<p>មកដល់អាយុ ៦ខែ ទារកទទួលបានវ៉ាក់សាំង ៣ដង ដែលអាចជាវ៉ាក់សាំង DPT ជាបន្តបន្ទាប់ ឬមួយជាវ៉ាក់សាំង pentavalent ឬ hexavalent ។</p> <ul style="list-style-type: none"> • អាចនឹងត្រូវការវ៉ាក់សាំងរំលឹកនៅអាយុ ១២ ទៅ ១៥ខែ។ • មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារអាយុលើសពី ៥ឆ្នាំ និងមនុស្សពេញវ័យ ជាធម្មតាមិនត្រូវការវ៉ាក់សាំង Hib ទេ លើកលែងតែពួកគេមានជំងឺ sickle cell ឬបញ្ហាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។ 	<p>បាក់តេរី haemophilus influenza ប្រភេទបេ មិនដូចជាមេរោគគ្រុនផ្តាសាយ ដែលគេហៅថាជំងឺគ្រុនផ្តាសាយនោះទេ ។ វាគឺជាមេរោគដែលបណ្តាលឱ្យរលាកស្រាមខ្នុរ រលាកសួត ជំងឺស្បែកនិងឆ្អឹង និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀត។</p>
<p>វ៉ាក់សាំង Polio (OPV, IPV) ការពារពីជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ</p>	
<p>មកដល់អាយុ ៦ខែ ទារកទទួលបានវ៉ាក់សាំង ៣ ឬ ៤ដូសជាបន្តបន្ទាប់។</p> <ul style="list-style-type: none"> • ដូសដំបូងគេ ត្រូវបានផ្តល់នៅពេលកើត និងដូសផ្សេងទៀត នៅក្នុងអំឡុងអាយុ ៦ខែ រួមជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំង DPT ជាបន្តបន្ទាប់ ។ • វ៉ាក់សាំង OPV (វ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនផ្តាសាយដៃជើងប្រភេទបន្តក់) គឺជាថ្នាំបន្តក់ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យតាមមាត់ ហើយវ៉ាក់សាំង IPV (វ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនផ្តាសាយដៃជើងប្រភេទចាក់) ត្រូវបានផ្តល់ជាថ្នាំចាក់។ អាស្រ័យលើប្រទេសរបស់អ្នក ជាធម្មតា សេរីវ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្តាសាយដៃជើង រួមបញ្ចូលទាំង OPV និង IPV ។ 	<p>Polio គឺជាមេរោគដែលអាចបណ្តាលឱ្យខ្វិន មានបញ្ហាដកដង្ហើម ហើយសូម្បីតែស្លាប់។ ដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារពីវា នោះមេរោគ polio ស្ទើរតែ បានលុបបំបាត់ទាំងស្រុងទៅហើយ។</p>
<p>វ៉ាក់សាំង rotavirus (RV) ការពារពីមេរោគ rotavirus</p>	
<p>មកដល់អាយុ ៦ខែ ទារកទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះ ២ ឬ ៣ដងអាស្រ័យលើពេលវេលាគ្រប់វ៉ាក់សាំង។ វាត្រូវបានបន្តក់ទៅក្នុងមាត់។</p> <ul style="list-style-type: none"> • ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងវ៉ាក់សាំង DPT ឬ pentavalent ។ • ក្នុងអំឡុងពេល ២សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីផ្តល់វ៉ាក់សាំងឱ្យទារក សូមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលាងសម្អាតដៃឱ្យបានស្អាតល្អនៅពេលប្តូរក្រណាត់កន្ទបដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺស្រាលមួយចំនួន។ 	<p>Rotavirus គឺជាជំងឺញឹកញាប់ដែលបណ្តាលឱ្យកង្វះច្រូន គ្រុនក្តៅ និងក្អក។ វាឆ្លងរាលដាលយ៉ាងងាយ និងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចំពោះទារកនិងកុមារតូចៗ។</p>
<p>វ៉ាក់សាំង Pneumococcal (conjugate) ការពារពីជំងឺរលាកសួត និងការបង្កមេរោគផ្សេងៗទៀត</p>	
<p>ទារកទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង ៣ដង។</p> <ul style="list-style-type: none"> • ជាធម្មតា វ៉ាក់សាំងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងវ៉ាក់សាំង DPT ឬ pentavalent ប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្លះតែចាក់ ២ដងដំបូងក្នុងអំឡុង ៦ខែ និងចាក់លើកទី៣ នៅពេលក្រោយ។ 	<p>វ៉ាក់សាំងនេះការពារពីការបង្កមេរោគធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសួត ខួរក្បាលនិងឈាម ដែលវាបណ្តាលមកពីមេរោគ pneumococcus ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យកុមារទាំងអស់ គឺជាអាទិភាព ប៉ុន្តែវាក៏ជួយការពារមនុស្សពេញវ័យពីជំងឺរលាកសួតផងដែរ។</p>
<p>វ៉ាក់សាំង MR, MMR ការពារពីជំងឺកញ្ជ្រើល</p>	
<p>ជាញឹកញាប់ វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជាផ្នែកមួយនៃវ៉ាក់សាំងរួមបញ្ចូលគ្នា អាចជាវ៉ាក់សាំង MR (ជំងឺកញ្ជ្រើល និងជំងឺស្លូត) ឬក៏វ៉ាក់សាំង MMR (ជំងឺកញ្ជ្រើល, ក្រឡាទែន, និងជំងឺស្លូត)។ កុមារនឹងត្រូវការយ៉ាងតិច ២ដូស។</p> <ul style="list-style-type: none"> • ក្នុងពេលផ្ទះជំងឺកញ្ជ្រើល ទារកដែលមានអាយុ ៦ខែ អាចនឹងត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំង។ ពួកគេទទួលបានវ៉ាក់សាំងធម្មតា ២ដូសបន្ទាប់ពីនោះទៀត។ • កុមារដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ក៏ត្រូវការការចាក់ ២ឬ៣ដូសកាល ៣ដងផងដែរ ប៉ុន្តែកុមារដែលឈឺធ្ងន់ពីមេរោគអេដស៍ ត្រូវការការព្យាបាលមេរោគអេដស៍ និងឱ្យមានសុខភាពនឹងនជាមុនសិន មុននឹងទទួលវ៉ាក់សាំង។ 	<p>ជំងឺកញ្ជ្រើលឆ្លងរាលដាលយ៉ាងងាយក្នុងចំណោមក្មេងៗ ហើយធ្វើឱ្យឡើងកន្ទួលគ្រុនក្តៅ និងក្អក។ បើមិនព្យាបាលទេ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺរាក ពិការភ្នែក ឬស្លាប់។</p>

វ៉ាក់សាំង Rubella, MR, MMR ការពារពីជំងឺស្លូត	
<p>កុមារត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់ ១ម្ដង។ សូមផ្តល់ឲ្យជាមួយនឹង វ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ជ្រើលលើកដំបូង។</p> <ul style="list-style-type: none"> • កុមារជាច្រើនទទួលបានការចាក់ ២ដង ដោយសារវ៉ាក់សាំង Rubella គឺជាផ្នែកមួយនៃវ៉ាក់សាំងរួមគ្នា ២ប្រភេទ គឺវ៉ាក់សាំង MR (ជំងឺកញ្ជ្រើល និងជំងឺស្លូត) និងវ៉ាក់សាំង MMR (ជំងឺកញ្ជ្រើល, ក្រឡាទែន និងជំងឺស្លូត) ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យចំនួន ២ដង។ • នៅតំបន់ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងកាលពី នៅជាទារកទេ នោះយុទ្ធនាការផ្តល់វ៉ាក់សាំង Rubella អាចនឹង ផ្តោតទៅលើក្មេងស្រីអាយុច្រើន។ 	<p>ជំងឺស្លូតអាចធ្វើឱ្យឡើងកន្ទួល និង គ្រុនក្តៅ រួចវាបាត់ទៅវិញ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ មានជំងឺ ស្លូត នោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចំពោះ កូនក្នុងផ្ទៃ។</p> <p>ការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារទាំងអស់ ជួយបណ្តេញជំងឺស្លូតឲ្យទៅឆ្ងាយ ហើយវានឹងជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ មិនឲ្យកើតជំងឺនេះដែរ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្មេងស្រីដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង ជំងឺស្លូត នឹងមិនកើតវាទេនៅពេល មានផ្ទៃពោះពេលពេញវ័យ។</p>
វ៉ាក់សាំង HPV ការពារពីមេរោគ human papillomavirus	
<p>ក្មេងស្រីត្រូវការ ២ឬ៣ម្ដង អាស្រ័យលើអាយុរបស់ពួកគេ។</p> <ul style="list-style-type: none"> • ការចាក់លើកទី១ ត្រូវបានផ្តល់នៅចន្លោះអាយុ ៩ ឬ១០ឆ្នាំ ហើយលើកទី២ នៅ ១ខែបន្ទាប់។ ចំពោះស្ត្រីដែលមានអាយុ ចាប់ពី ១៥ឆ្នាំឡើងទៅ៖ ផ្តល់ការចាក់លើកទី១, រង់ចាំ ៤សប្តាហ៍ សម្រាប់លើកទី២, រង់ចាំ ១២សប្តាហ៍សម្រាប់លើកទី៣។ 	<p>វ៉ាក់សាំងនេះបង្ការមហារីកមាត់ស្បូន ចំពោះស្ត្រី និងមហារីកមួយចំនួន ចំពោះបុរស។ វាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ ក្មេងស្រី ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានថវិកានិង ការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ ប្រទេសខ្លះផ្តល់ វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យក្មេងប្រុសផងដែរ។</p>

វ៉ាក់សាំងដែលប្រើនៅតែតំបន់មួយចំនួន និងវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗទៀតដែល បានតែមនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការ

ជំងឺអាសន្នរោគ

ជំងឺអាសន្នរោគ គឺជាជំងឺរាកដែលអាចសម្លាប់ មនុស្សយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមរយៈភាពខ្សោះ ជាតិទឹក ជាពិសេសចំពោះទារកនិងកុមារ។ (សូមអានជំពូក ការឈឺពោះ ជំងឺរាក និងព្រូន, ទំព័រ ២៨ ទៅ ២៩)។

វ៉ាក់សាំងការពារពីជំងឺអាសន្នរោគ ត្រូវបាន ប្រើតាមមាត់ ហើយប្រើប្រាស់នៅតំបន់ដែល ទើបចាប់ផ្តើមផ្ទះ ឬដែលអាចនឹងផ្ទះឡើង ជាពិសេសនៅតាមជំរុំប្លុកផ្ទះតាំងលំនៅ របស់ជនភៀសខ្លួន។ អាចត្រូវការ ២ដួស ឬ ៣ដួស អាស្រ័យលើអ្នកក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង។ ប្រសិនបើជំងឺអាសន្នរោគត្រឡប់មកតំបន់នោះវិញ ប្រជាជនអាចត្រូវការដួសពេញលេញ ឬគ្រាន់តែ ១ដួសរំពួកប៉ុណ្ណោះ។




ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ស្ត្រីបំបៅកូនដោយទឹកដោះ និងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ គួរតែត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុង យុទ្ធនាការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគណាមួយ។

ចំងីរលាក់បង្កដោយបាក់តេរី meningococcus

វ៉ាក់សាំងនេះបង្ការជំងឺរលាកខួរក្បាលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្តាល។ វ៉ាក់សាំងនេះគឺសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលនឹងត្រូវការវាប្រសិនបើមានការផ្ទុះឡើង។ វាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។ គេនឹងត្រូវការ ១ ឬ ២ដូស អាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង។ នៅប្រទេសផ្សេងៗ គេប្រើប្រភេទមួយនៃវ៉ាក់សាំងនេះ ដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងមេរោគ meningococcal ដែលកំពុងមានវត្តមាន។

ចំងីរគ្រុនលៀង

គ្រុនលៀង គឺជាមេរោគមួយដែលត្រូវបានចម្លងដោយសត្វមូស។ នៅពេលមេរោគគ្រុនលៀងចូលទៅដល់តំបន់ថ្មីមួយ វាឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់កុមារតូចៗ។



នៅតំបន់ដែលកើតមានជំងឺគ្រុនលៀងញឹកញាប់ សូមផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារ ១ដូសក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងជំងឺកញ្ជ្រើល នៅអាយុ ៩ ទៅ ១២ខែ។ ប្រសិនបើជំងឺគ្រុនលៀងចូលមកដល់តំបន់ថ្មី សូមផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នា រួមទាំងទារកដែលមានអាយុចាប់ពី ៦ខែ។

ចំងីរលាក់ខួរក្បាល ជេអ៊ី

ជំងឺរលាកខួរក្បាល ជេអ៊ី គឺជាមេរោគដែលត្រូវបានចម្លងដោយសត្វមូសនៅតាមតំបន់ខ្លះនៅអាស៊ី។ យុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ អាចនឹងផ្តោតជាជំហ្មងទៅលើកុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុតិចជាង ១៥ឆ្នាំ។ បន្ទាប់ពីនោះមក មានតែទារកទើបនឹងកើតប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។ កុមារត្រូវការ ១ ឬ ២ដូស អាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង។

ចំងីរលាក់ខួរក្បាលបណ្តាលមកពីចំងើលសត្វ

ជំងឺរលាកខួរក្បាលនេះ ត្រូវបានចម្លងដោយចំងើលសត្វ និងសត្វល្អិតតូចៗដែលខាំចោះទៅក្នុងស្បែកហើយពិបាកនឹងមើលឃើញណាស់។ ជារឿយៗ កុមារត្រូវការចាក់ ៣ដូស, លើកដំបូងនៅអាយុ ១ ឬ ៣ឆ្នាំ, លើកទី២ នៅ ១ ទៅ ៧ខែក្រោយ, និងលើកទី៣ នៅ ៩ ទៅ ១២ខែបន្ទាប់ពីចាក់លើកទី២, អាស្រ័យលើប្រភេទនិងក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង។ នៅតំបន់ដែលមានកើតញឹកញាប់នូវជំងឺរលាកខួរក្បាលបង្កដោយចំងើល, គេនឹងត្រូវការវ៉ាក់សាំងរំព្យកររាល់ ៣ ទៅ ៥ឆ្នាំម្តង។ ដោយសារជំងឺនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់ នោះយុទ្ធនាការអាចនឹងផ្តោតទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្សពេញវ័យអាយុលើលពី ៥០ឆ្នាំ។

ចំងីរលាក់ថ្លើមប្រភេទអា

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទអា ត្រូវបានឆ្លងរាលដាលដោយអាហារឬទឹកដែលមានមេរោគ ហើយវាធ្វើឱ្យខូចថ្លើម។ វាបណ្តាលឱ្យអស់កម្លាំងខ្លាំង ជួនកាលមានរយៈពេលជាច្រើនខែ។ វាបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងហើយនឹងមិនត្រឡប់មកវិញទេ។ នៅតំបន់ដែលមានកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទអា ជាញឹកញាប់ នោះមិនចាំបាច់ប្រើវ៉ាក់សាំងទេ ប៉ុន្តែនៅតំបន់ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនធ្លាប់ឈឺ នោះវ៉ាក់សាំងនឹងបង្ការជំងឺ។

គេនឹងត្រូវការវ៉ាក់សាំង ១ ឬ ២ដូស អាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិត។ នៅពេលផ្តល់ឱ្យកុមារជាទៀងទាត់ ការចាក់លើកទី១ ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅអាយុប្រហែល ១២ខែ និងលើកទី២ នៅ ៦ ទៅ ១៨ខែក្រោយ។

ជំងឺអុតស្វាយ (varicella)

វ៉ាក់សាំងនេះបង្ការជំងឺអុតស្វាយដែលវាបណ្តាលឱ្យមានគ្រុនក្តៅ ឡើងកន្ទួល រមាស់ និងអស់កំលាំងក្នុងអំឡុង ១ ឬ ២សប្តាហ៍។ អាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិត គេត្រូវការចាក់ ១ ឬ ២ម្តងឱ្យកុមារទាំងអស់ ហើយជូនកាលឱ្យកុមារធំ និងមនុស្សពេញវ័យ។

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ (flu)

គ្រុនផ្តាសាយ គឺជាឈ្មោះរបស់វីរុសមួយក្រុមដែលឆ្លងរាលដាលរយៈពេលពីរខែជាដាច់ខាតរាល់ឆ្នាំ បណ្តាលឱ្យមានគ្រុនក្តៅ ញ័រញាក់ និងសញ្ញាផ្សេងៗទៀតស្រដៀងនឹងជំងឺផ្តាសាយ ប៉ុន្តែធ្ងន់ធ្ងរជាង។ មនុស្សភាគច្រើននឹងជាសះស្បើយពីជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ ប៉ុន្តែវាអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ទារក មនុស្សចាស់ ឬអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាព។ វ៉ាក់សាំងថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតជាដាច់ខាតដើម្បីការពារវីរុសគ្រុនផ្តាសាយ។ ជាញឹកញាប់ ការចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ គឺជាអាទិភាព ពីព្រោះពួកគាត់នឹងផ្ទេរការការពារដល់ទារកដែលកំពុងលូតលាស់ដែលមិនអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបានយ៉ាងហោចណាស់ ៦ខែ។


ជាធម្មតាត្រូវការការចាក់ ១ម្តងជាដាច់ខាតរាល់ឆ្នាំ។ នៅលើកដំបូងដែលពួកគេត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំង កុមារអាយុ ៦ខែទៅ ៥ឆ្នាំត្រូវបានចាក់ ២ម្តង ក្នុងពេល ៤សប្តាហ៍ដាច់ពីគ្នា។

ជំងឺគ្រុនពោះរៀន

គ្រុនពោះរៀន គឺជាជំងឺឆ្លងដែលបណ្តាលឱ្យមានគ្រុនក្តៅ ក្អក និងសញ្ញាផ្សេងៗទៀត។ វាអាចត្រូវបានព្យាបាលដោយថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច។ ជំងឺគ្រុនពោះរៀន ឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈអាហារ ឬទឹក។ ការលាងសម្អាត និងការទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យល្អ បង្ការការឆ្លងរាលដាល។ វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺគ្រុនពោះរៀននេះមានជាពីរទម្រង់៖ ថ្នាំចាក់ ឬថ្នាំគ្រាប់។ ភាគច្រើនវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានប្រើនៅពេលមានការផ្ទុះជំងឺគ្រុនពោះរៀន ហើយក៏សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅតំបន់ដែលមានជំងឺគ្រុនពោះរៀនជាញឹកញាប់។

ជំងឺឆ្កែឆ្លុត

មេរោគឆ្កែឆ្លុត គឺជាវីរុសដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិត ហើយចម្លងដោយសត្វ, ជាទូទៅសត្វឆ្កែ សត្វឆ្មា ឬប្រដៅ។ ជំងឺឆ្កែឆ្លុតគឺជាករណីកម្រនៅក្នុងប្រទេសខ្លះ ហើយក៏ជាករណីញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យសត្វឆ្កែទាំងអស់ នឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស។ ប្រសិនបើសត្វដែលមានមេរោគឆ្កែឆ្លុត ខានរណាម្នាក់ នោះជនរងគ្រោះត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្កែឆ្លុតជាបន្តបន្ទាប់(សេរី) ដែលត្រូវចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ ហើយពួកគេក៏ប្រហែលជាត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្លុត (rabies immunoglobulin) ផងដែរ(មើលជំពូកស្តីពី ជំនួយបឋម ទំព័រ ៧៥)។ ការលាងសម្អាតមុខរបួសឱ្យបានល្អ ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកយ៉ាងហោចណាស់ ១៥នាទី គឺជាកិច្ចសំខាន់ណាស់។



ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្កែឆ្លុតបន្ទាប់ពីសត្វខាំ នៅពេលដែលអ្នករបួសត្រូវការទាំងថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្លុត (rabies immunoglobulin) និងវ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្កែឆ្លុត សូមផ្តល់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្លុតជាមុន បន្ទាប់មកប្រើមូលស្អាតមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង។ សូមចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យអស់ពីដប់ (អាចជា ០,៥មីលីលីត្រ ឬ ១មីលីលីត្រ អាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង) ទៅក្នុងសាច់ដើមដៃនៅថ្ងៃខាំ, ហើយបន្ទាប់មកម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី៣ និងថ្ងៃទី៧ ។ បន្ទាប់មកថ្នាំចាក់លើកទី៤ ត្រូវបានចាក់ក្នុងចន្លោះ ១៤ថ្ងៃ (២សប្តាហ៍) និង ២៨ថ្ងៃ (៤សប្តាហ៍) បន្ទាប់ពីខាំ។ ចំពោះកុមារអាយុ ២ឆ្នាំឬក្មេងជាងនេះ ត្រូវចាក់នៅភ្លៅខាងលើ។ សូមកុំចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្កែឆ្លុតនៅលើកំប៉េះតូទ។

បើទោះជាគ្មានថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្លងក៏ដោយ ការលាងសម្អាតស្បែកឱ្យបានល្អស្លាមៗ រួចផ្តល់វ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្លងត្រូវបានបន្តបន្ទាប់(សេរី) អាចបង្ការជំងឺឆ្លងបាន។

វ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្លងត្រូវបានគេផ្តល់ឱ្យដើម្បីបង្ការជំងឺឆ្លង មុនពេលមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសត្វខាំ ប៉ុន្តែជាធម្មតាគេត្រូវការប្រើចំពោះអ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយសត្វដែលទំនងជាមានមេរោគឆ្លងតែប៉ុណ្ណោះ។

បុគ្គលិកសុខាភិបាល: គន្លឹះក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំង

បុគ្គលិកសុខាភិបាលគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការជួយឱ្យកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសុខភាពល្អ។ បើទោះជាអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលផ្តល់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយ ក៏អ្នកដទៃស្តាប់ដំបូន្មានរបស់អ្នកដែរ។ ក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់របស់សហគមន៍ ប្រជាជនប្រហែលជាទុកចិត្តលើអ្នក ជាងមន្ត្រីក្រៅសហគមន៍ដែលមកពីកម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការរបស់រដ្ឋ។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅមណ្ឌលសុខភាពឬគ្លីនិក:

- សូមមានភាពរួសរាយនិងស្វាគមន៍ដល់ឪពុកម្តាយទាំងឡាយ។ ឱ្យពួកគាត់ដឹងថាសំណួររបស់គាត់ គឺជាសំណួរល្អ ហើយកុំឱ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះការសួរនោះ។
- ដោយសារការចាក់ថ្នាំអាចធ្វើឱ្យឈឺចាប់សូមព្យាយាមធ្វើឱ្យកុមារមិនសូវឈឺ។ អ្នកអាចបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់កុមារ ក្លាមៗបន្ទាប់ពីការចាក់ ដោយប្រើវត្ថុផ្សេងៗដែលមានពណ៌ភ្លឺៗ ឬធ្វើឱ្យមានសំឡេង។



ខ្ញុំនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងរហ័ស ដើម្បីកុំឱ្យគាត់ឈឺខ្លាំង។ តើអ្នកអាចឱ្យគាត់ឱ្យណែនាំបន្តិច ដើម្បីឱ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព?

- នៅក្នុងហ្វូងមនុស្ស ឬជាមួយគ្រួសារនីមួយៗ សូមពន្យល់ពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនីមួយៗ និងមូលហេតុដែលត្រូវការវា មុននឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំង។ រៀបរាប់ថាតើវាជារឿងធម្មតាទេដែលវ៉ាក់សាំងនឹងធ្វើឱ្យមានគ្រុនក្តៅបន្តិចបន្តួច ឬឈឺចាប់នៅដៃ ដើម្បីកុំឱ្យឪពុកម្តាយព្រួយបារម្ភ។ ពន្យល់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើឪពុកម្តាយកត់សំគាល់ឃើញសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយ ដូចជាប្រតិកម្មអាឡែស៊ីជាដើម។

- ប្រសិនបើអស់វ៉ាក់សាំងដែលចាំបាច់ សូមពិនិត្យមើលថាតើវាអាចរកបាននៅគ្លីនិកផ្សេងទៀតដែរឬទេ ឬណាត់ក្រុមគ្រួសារនៅថ្ងៃណាដែលពួកគាត់អាចត្រឡប់មកវិញបាន។ អ្នកអាចសរសេរការរំលឹកនៅលើប័ណ្ណគ្លីនិក ឬប័ណ្ណទទួលថ្នាំបង្ការ។
- ជួយក្រុមគ្រួសារក្នុងការរក្សាទុកកំណត់ត្រាទទួលវ៉ាក់សាំង ក្នុងសៀវភៅសុខភាពរបស់កុមារ ឬតាមវិធីផ្សេងៗ។ បែបនេះលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាជនរៀបចំនិងសម្រេចចិត្តចំពោះសុខភាពកូនរបស់ខ្លួន។



ខ្ញុំសុំទោស រថយន្តក្រុងរបស់បងមកយឺតណាស់។ យើងនៅតែរករកផ្តល់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃនេះបាន បើបងអាចរង់ចាំបន្តិច។ បងធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយណាស់!


គ្លីនិកសុខភាពជាច្រើន មិនទទួលបានធនធានទាំងឡាយដែលពួកគាត់ត្រូវការនោះទេ។ ប្រសិនបើបញ្ហា នេះ ធ្វើឱ្យប្រជាជនមានបទពិសោធន៍មិនល្អនៅក្នុងគ្លីនិក នោះពួកគេប្រហែលជាមិនត្រឡប់មកទទួល វ៉ាក់សាំងវិញនោះទេ។ ប៉ុន្តែទោះបីជាមានបុគ្គលិកឬការផ្គត់ផ្គង់តិចក៏ដោយ គួររកវិធីធ្វើឱ្យប្រជាជនមាន អារម្មណ៍ល្អក្នុងពេលមកលើកនេះ។

នៅក្នុងសហគមន៍ សូមលើកទឹកចិត្តឱ្យក្រុមគ្រួសារទទួលវ៉ាក់សាំង៖

- ផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យដល់ទាំងម្តាយនិងឪពុក។ ទោះបីជាម្តាយតែងតែនាំកូនទៅមណ្ឌលសុខភាពក៏ដោយ នៅពេលដែលឪពុកក៏បានយល់ពីសារសំខាន់នៃវ៉ាក់សាំង នោះកុមារកាន់តែងាយនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង ដែរ។ អាចនឹងមានប្រយោជន៍ផងដែរ ក្នុងការនិយាយជាមួយជីដូនជីតាឬសមាជិកគ្រួសារផ្សេងៗទៀត។
- ប្រសិនបើគ្រួសារមួយកំពុងគេចវេសពីការទទួលវ៉ាក់សាំង ចូរស្វែងរកមូលហេតុរបស់គាត់។ ប្រហែលជា បញ្ហាទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរ ខ្វះប្រាក់ ឬអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចជួយដោះស្រាយបាន។ សូម អះអាងប្រាប់ពួកគេអំពីសុវត្ថិភាពនិងគុណតម្លៃរបស់វ៉ាក់សាំង។
- បណ្តុះបណ្តាលឆ្មបឬអ្នកដទៃទៀតដែលជួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងម្តាយថ្មីៗ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចឆ្លើយ សំណួរអំពីថ្នាំបង្ការ និងជួយឱ្យប្រជាជនទទួលបាន។
- រួមបញ្ចូលកុមារក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីវ៉ាក់សាំង។ ប្រសិនបើកុមាររៀនអំពីវ៉ាក់សាំងនៅសាលារៀន នោះ ពួកគេអាចនិយាយជាមួយឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនអំពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងឱ្យបងប្អូន សមាជិកគ្រួសារ និង អ្នកជិតខាង។
- ធ្វើកិច្ចការណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។ ការដដែលជាមួយប្រជាជននៅតាម ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ អាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាព។ ឬមួយអ្នកអាចនឹងស្វែងយល់ថា ឪពុកម្តាយចូលចិត្តទៅ មណ្ឌលសុខភាព។ ការដដែលជាមួយគ្រូបង្រៀន និងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍នានា អាចនឹងលើកទឹកចិត្ត មនុស្សឱ្យទទួលវ៉ាក់សាំង។



រូបអ្នកស្គាល់សហគមន៍របស់អ្នកច្បាស់ជាងគេ។ នៅពេលធ្វើការរៀបចំដើម្បីធានាថាកុមារគ្រប់រូបទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន ចូរពិនិត្យមើលថាតើនរណាដែលអ្នកកំពុងធ្វើការជាមួយ និងថាតើអ្វីទៅដែលជំរុញទឹកចិត្តគាត់, អ្វីខ្លះជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់, តើនរណាដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារ, និងថាតើគួររួមបញ្ចូលអ្នកដឹកនាំសហគមន៍តាមរបៀបណា។ ម្យ៉ាងទៀត គួរស្វែងយល់ថាតើវាពិបាកដែរឬទេសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការទទួលដំបូន្មានសុខភាពនិងសេវាសុខភាព ហើយអ្វីទៅដែលជួយធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួល។



សាលារៀនអាចបង្រៀនមនុស្សវ័យក្មេងអំពីសារសំខាន់នៃវ៉ាក់សាំង និងពីដំណើរការរបស់វាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ។ កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការក៏អាចរួមបញ្ចូលកុមារផងដែរ ដោយការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនៅសាលារៀន។

ដំណឹងក្នុងវិទ្យុ មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់យើង។

ខ្ញុំជារបស់កម្ពុជាវ៉ាក់សាំងប្រចាំក្រុមប្រក្សា ក្រុងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រជាជនរំភើបរីករាយនិងចូលរួមជាមួយគ្នា។

ឪពុកម្តាយចូលចិត្តសារវិញ្ញាណវិវ៉ាក់សាំងដែលគ្លីនិករបស់យើងធ្វើឲ្យពួកគេ។

ខ្ញុំជួយក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំស្វែងរកព័ត៌មានគួរឱ្យទុកចិត្តរំពឹងវ៉ាក់សាំង។


ការចូលរួមជាសាធារណៈ ៖ ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដើម្បីសមភាព

ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ អាចលុបបំបាត់ ឬកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺជាច្រើនដែលពីមុនបានបណ្តាលឱ្យស្លាប់ឬមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ប៉ុន្តែភាគច្រើន វាកើតឡើងតែនៅប្រទេសដែលការផ្តល់ថ្នាំបង្ការគឺធ្វើឡើងដោយឥតគិតប្រាក់ ឬមិនសូវថ្លៃ ហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនោះអាចផ្តល់ជូនប្រជាជនបាន។ បុគ្គលិកសុខាភិបាល គ្រូបង្រៀន និងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដទៃទៀត គួរបញ្ចេញមតិយោបល់ដើម្បីធានាថា វ៉ាក់សាំងតែងតែមានសុវត្ថិភាព, ផ្តល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ, និងអាចរកបានសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការវាទាំងក្មេងនិងចាស់។ ប្រជាពលរដ្ឋគួរផ្តល់យោបល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួន ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកមិនស្អាត កង្វះអនាម័យ និងកង្វះវ៉ាក់សាំង - ដែលបញ្ហាទាំងនេះបណ្តាលឲ្យមានសុខភាពមិនល្អ។

ការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំង

រក្សាទុកវ៉ាក់សាំងនៅសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវ (រក្សា ភាពត្រជាក់នៅធានស្ថិតស្ថេរ)

ជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវរក្សាវ៉ាក់សាំងក្នុង សីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងមិនត្រជាក់ វាអាចនឹងខូច ហើយគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេ។ ហើយ វ៉ាក់សាំងខ្លះត្រូវតែនៅត្រជាក់ ប៉ុន្តែមិនអាចបង្អួកបានទេ បើមិនដូច្នោះទេ វាគ្មានប្រសិទ្ធភាពដែរ។ វ៉ាក់សាំង ចាំបាច់ត្រូវរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវចេញពី រោងចក្រ។ នៅពេលណាមួយ រាប់ពីពេលចេញពីរោង ចក្រទៅកន្លែងរក្សាទុក បើវ៉ាក់សាំងមានកម្ដៅខ្លាំង ឬកកក្នុងពេលមិនគួរកក នោះវានឹងក្លាយជាគ្មាន ប្រយោជន៍។



- វ៉ាក់សាំងដែលអាចបង្អួកបាន**
- វ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ជ្រើល
 - វ៉ាក់សាំង MR
 - វ៉ាក់សាំង MMR
 - វ៉ាក់សាំង BCG
 - វ៉ាក់សាំង OPV (oral poliovirus)
 - ប្រភេទបន្តក់
 - វ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនឈឿង
 - វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកខួរក្បាល ជេអ៊ី
- វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវចាក់ឱ្យត្រជាក់ខ្លាំង ប៉ុន្តែមិនត្រូវ បង្អួក**
- វ៉ាក់សាំងជំងឺអាសន្នរោគ
 - វ៉ាក់សាំង Pentavalent
 - វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ (Hep B)
 - វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកសួត-រលាកស្រោម ខួរក្បាលដោយប៊ុប (ទឹក)
 - វ៉ាក់សាំង HPV (human papillomavirus)
 - វ៉ាក់សាំង IPV (inactivated poliovirus)
 - វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយ
 - វ៉ាក់សាំង Pneumococcal
 - វ៉ាក់សាំង Rotavirus (ទឹក និងបង្អួកសួត)
 - វ៉ាក់សាំងជំងឺតេតាណូស (DT, Td)

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងរក្សាទុកវ៉ាក់សាំង ក៏ដូចជាទឹកលាយដែលត្រូវបាន ប្រើដើម្បីពង្រាវវា។ សូមស្វែងយល់ថាតើវ៉ាក់សាំង ណាត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពណា ហើយ ធ្វើវេណាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដាក់វ៉ាក់សាំងណា។ ជាទូទៅ វ៉ាក់សាំងត្រូវបានរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាព ក្រោម ផង្សាសេ នឹងលើកម្រិតបង្អួកបន្តិច (២អង្សា សេ)។ សូមមើលបញ្ជីវ៉ាក់សាំងលើប្រអប់ ថាតើ វ៉ាក់សាំងណាដែលមិនត្រូវឱ្យឡើងកំដៅពេក និង ណាខ្លះដែលត្រូវបង្អួក។


វ៉ាក់សាំងខ្លះអាចនឹងខូចក្រោមពន្លឺខ្លាំង ដូចជា វ៉ាក់សាំង BCG និង MMR ។ ដើម្បីការពារវាពីពន្លឺថ្ងៃ និងពន្លឺខាងក្នុងខ្លាំង ចូររក្សាវានៅក្នុងដបកញ្ចក់ខ្មៅ របស់វា និងក្នុងកញ្ចប់ក្រៅរបស់វា។

នៅពេលវ៉ាក់សាំងមួយត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ ដោយ បានពង្រាវជាមួយនឹងទឹកលាយរួចហើយ នោះក៏ត្រូវ រក្សាវាឱ្យត្រជាក់ផងដែរ។ អ្នកដែលបានទទួលការ ហ្វឹកហាត់ផ្នែកថែរក្សាវ៉ាក់សាំង ប្រាកដជាដឹងថាតើ វ៉ាក់សាំងនៅមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានម៉ោង បន្ទាប់ពី លាយរួច និងថាត្រូវបោះចោលដែរឬទេនៅពេលចប់ ម៉ោងការងារ។

រៀនពីរបៀបរក្សាទុក លាយ និងផ្តល់វ៉ាក់សាំង

មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចលើកកម្ពស់ការផ្តល់វ៉ាក់សាំង ហើយបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាច្រើនបានរៀនពីវិធី ផ្តល់វ៉ាក់សាំងផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងផ្តល់ វ៉ាក់សាំង ឬទុកដាក់វ៉ាក់សាំង ការបណ្តុះបណ្តាល របស់អ្នកនឹងរួមបញ្ចូល៖

- របៀបរៀបចំ(លាយ)វ៉ាក់សាំង
- របៀបកំណត់កម្រិតដួសត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុម អាយុផ្សេងៗគ្នា
- កន្លែងណាដែលត្រូវរកមើលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ និងរបៀបចោលវ៉ាក់សាំង ដែលផុតកំណត់
- របៀបជ្រើសរើសទំហំមូលត្រឹមត្រូវ មុំសម្រាប់ចាក់ និងកន្លែងត្រូវចាក់ទៅលើ រាងកាយ ចំពោះវ៉ាក់សាំងនីមួយៗ



ដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នក និងសុខភាពរបស់មនុស្សដែលអ្នកកំពុងជួយ សូមលាង សម្អាតដៃរបស់អ្នក មុនពេលផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗ។ ប្រើម្ហូបតែមួយ លើកម្តងៗ ហើយបន្ទាប់មកបោះចោលវាដោយសុវត្ថិភាព។



ទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណល់វ៉ាក់សាំង

ជាញឹកញាប់គេភ្លេចនូវជំហានចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាផ្តល់ថ្នាំបង្ការ៖ គឺបោះចោលសំណល់ឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវ។ សម្ភារៈប្លាស្ទិក មូល និងសម្ភារៈដីរ័: ដែលនៅសល់ចោល នឹងបង្កើតជាបញ្ហាសុខភាពដល់មនុស្ស និងបរិស្ថាន ជាពិសេស បើវាត្រូវបានដុតឬកប់ដោយគ្មានសុវត្ថិភាព ឬទុកចោលនៅកន្លែងដែលកុមារ អាចយកបាន។ កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការ អាចធ្វើផែនការបោះចោលសំណល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព តាមរយៈការ ៖

- ប្រើប្រាស់ឃានយន្តដដែលដែលបានដឹកជញ្ជូនបរិក្ខារ មកដឹកកាកសំណល់ទៅកែច្នៃ ឬទៅបោះចោលដោយ សុវត្ថិភាព។
- បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់សម្រាប់កែច្នៃ កាកសំណល់ ដោយមានរណ្តៅកប់ជាច្រើន។
- ជួយដល់គ្លីនិកក្នុងសហគមន៍ឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធសាមញ្ញ សម្រាប់ចោលកាកសំណល់ថែទាំសុខភាព រួមទាំងការ ញែកកាកសំណល់ និងរណ្តៅកប់សុវត្ថិភាព។ (សូម មើលសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍សហគមន៍ស្តីពីសុខភាព បរិស្ថាន ជំពូកទី១៖ កាកសំណល់ពីការថែទាំសុខភាព)។

