

ជំពូកទី ៨

សុខភាពខាងផ្លូវភេទ

ការទប់ស្កាត់ជំងឺកាមរោគ រួមទាំងវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍



សុខភាពខាងផ្លូវភេទ គឺជាស្ថានភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍នៃសុខុមាលភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងសប្បាយរីករាយ និងសំដែងអារម្មណ៍នៃផ្លូវភេទ ។ យើងអាចរក្សាសុខភាពផ្លូវភេទរបស់យើងឱ្យមាំមួន ដោយការរៀនអំពីរាងកាយរបស់យើង និងអ្វីដែលផ្តល់ការរីករាយដល់យើង រួមទាំងការកាត់បន្ថយអ្វីដែលងាយរងគ្រោះនៃការមិនចង់មានផ្ទៃពោះ និងកុំឱ្យឆ្លងជំងឺកាមរោគតាមរយៈការរួមភេទ ។

នៅតាមសហគមន៍ជាច្រើនតែងមានជំនឿខុសទំនង ដែលអាចបង្កជាទុក្ខទោសអំពីអ្វីទៅជាស្ត្រីត្រឹមត្រូវ ឬ ស្ត្រីគ្រប់លក្ខណ៍ជំនឿទាំងនេះអាចមានការលំបាកសំរាប់ស្ត្រីក្នុងការមានរឿងរួមភេទប្រកបដោយសុខភាព ។ ដោយសារតែស្ត្រីមានអំណាចតិចតួចចំពោះការសំរេចចិត្តក្នុងរឿងរួមភេទ ហើយជាញឹកញយមិនអាចប្រឆាំងចំពោះការរួមភេទ ស្ត្រីរាប់លាននាក់ជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានឆ្លងវិរុសហ៊ីវនិងជំងឺកាមរោគផ្សេងៗ ។ ជួនកាលមនុស្សម្នាក់គិតថា ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានពិការភាពមិនអាចឆ្លងជំងឺឡើយ ។ រឿងនេះមិនពិតឡើយ ។ ស្ត្រីពិការនិងស្ត្រីមិនពិការ អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ ។

តាមពិតក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការ គឺស្ថិតក្នុងភាពងាយរងគ្រោះចំពោះជំងឺកាមរោគជាងស្ត្រីមិនពិការ ។ ពួកគេមិនត្រឹមតែមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីសុខភាពខាងផ្លូវភេទប៉ុណ្ណឹងឡើយ ពួកគេប្រហែលមានការត្រួតត្រាតិចតួចលើរបៀប និងជាមួយបុគ្គលដែលខ្លួនរួមភេទ ។ ករណីនេះកាន់តែធ្វើឱ្យពួកគេងាយរងគ្រោះចំពោះការកេងយកចំណេញក្នុងរឿងរួមភេទ ហើយកាន់តែងាយរងគ្រោះនៃការឆ្លងជំងឺកាមរោគ រួមទាំងវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ផង ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទចំពោះស្ត្រីពិការ ចូរអានជំពូកទី 14 ។ នៅក្នុងជំពូកនេះមានព័ត៌មានអំពីវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ និងជំងឺកាមរោគផ្សេងៗ និងវិធីទប់ស្កាត់ជំងឺទាំងនោះ ។ ការមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ ស្ត្រីអាចបោះជំហានទៅរកការការពារខ្លួនឯង និងរីករាយចំពោះការរួមភេទប្រកបដោយសុខភាព ។

តើអ្វីទៅជាជំងឺកាមរោគ? [Sexual Transmitted Diseases (STDs)]

ជំងឺកាមរោគ ជាជំងឺឆ្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតនៅពេលរួមភេទ ។ ជំងឺកាមរោគអាចចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈប្រភេទរួមភេទណាមួយ ។ វាអាចជាការរួមភេទដោយលិង្គស្រីកម្រិតយូនី ឬ លិង្គស្រីកម្រិតយូនី ឬ ការរួមភេទដោយប្រើមាត់ (មាត់នឹងលិង្គ ឬ មាត់នឹងយោនី) ។ ជួនកាលជំងឺកាមរោគអាចឆ្លងបានដោយគ្រាន់តែត្រជុំសម្លឹងដែលកើតជំងឺ ឬ យោនីដែលកើតជំងឺទៅនឹងប្រដាប់ភេទរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀត ។

ជំងឺឆ្លងដែលមិនព្យាបាលគឺមានគ្រោះថ្នាក់

ជំងឺកាមរោគជាច្រើនអាចត្រូវបានព្យាបាលដោយថ្នាំពេទ្យ ។ បើជំងឺទាំងនោះមិនបានព្យាបាលឱ្យទាន់ពេលវេលា ជំងឺកាមរោគអាចបណ្តាលឱ្យគ្មានលទ្ធភាពផ្តល់កំណើតកូនទាំងចំពោះស្ត្រីនិងបុរស, ទារកអាចកើតមិនគ្រប់ខែ ឬ តូចពេក ឬ ពិការភ្នែក, មានផ្ទៃពោះក្នុងដៃស្អួន, ឈឺរាប់ខែក្នុងពោះផ្នែកខាងក្រោម, កើតជំងឺមហារីកទ្វារស្បូន, ឬ ស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។



រោគសញ្ញានៃជំងឺកាមរោគ

អ្នកប្រហែលជាមានជំងឺកាមរោគ បើអ្នកមានរោគសញ្ញាមួយ ឬ ច្រើនដូចតទៅ :

- ធ្លាក់សពីរន្ធយោនីខុសធម្មតា ។
- ក្លិនខុសធម្មតាពីរន្ធយោនី ។
- ឈឺ ឬ មានអារម្មណ៍ខុសធម្មតាក្នុងពោះផ្នែកក្រោម ជាពិសេសពេលកំពុងរួមភេទជាមួយលិង្គស្រីកម្រិតយូនី ។
- រមាស់ខ្លាំង, កន្ទួលរមាស់, ដុំពក, ឬ រលាក/ដំបៅត្រង់ប្រដាប់ភេទ ។

អាស្រ័យលើពិការភាពរបស់អ្នក វាប្រហែលជាពិបាកសំរាប់អ្នកក្នុងការដឹងថា តើអ្នកមានរោគសញ្ញាទាំងនេះឬយ៉ាងណា ។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវការនិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្ត ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យចេះពិនិត្យរោគសញ្ញាទាំងឡាយនៃជំងឺកាមរោគ ។

ធ្លាក់សមានការប្រែប្រួល (ជាតិរំអិលក្នុងយោនីមានការប្រែប្រួល)

វាជារឿងធម្មតាក្នុងការមានជាតិរំអិល ឬ ជាតិរំអិល (ធ្លាក់ស) ខ្លះៗក្នុងរន្ធយោនី ។ នេះជាវិធីតាមធម្មជាតិដែលយោនីលាងសំអាតនិងការពារខ្លួនវា ។ ជាតិរំអិលប្រែប្រួលនៅអំឡុងនៃខួបឈាមរដូវ ។ ជាតិរំអិលមានសភាពខាប់ជាងមុន, ផ្លាស់រំអិលខ្លាំងចំនួនប្រមាណ 14 ថ្ងៃ មុនពេលអ្នកចាប់មានឈាមរដូវរាល់ខែ ។ ការប្រែប្រួលផ្សេងទៀតនៅក្នុងជាតិរំអិល គឺចំនួន ឬ ក្លិនរំអិលខុសពីរន្ធយោនីរបស់អ្នក ជួនកាលមានន័យថាអ្នកមានជំងឺរលាក ប៉ុន្តែពិបាកដឹងណាស់ពីជាតិរំអិល ថាតើអ្នកមានជំងឺរលាកប្រភេទណា ។ ចំពោះព័ត៌មានអំពីករណីធ្លាក់ស ដែលមិនមែនជាជំងឺកាមរោគ (ផ្សិតយីសនិងជំពូកបាក់តេរីនៃរន្ធយោនី) ចូរអានពីទំព័រ 111 ដល់ 113 ។

នីតិវិធីការពារមេរោគសញ្ញាដែលខ្លះខាងរោគ


បើអ្នកជាស្ត្រីពិការភ្នែក :- ពេលលាងសំអាតប្រដាប់ភេទរបស់អ្នក ចូរប្រើម្រាមដៃដើម្បីស្លាបពិនិត្យជាតិរំអិល/ធ្លាក់ស, ដុំពក ឬ កន្លែងដែលប៉ះទៅមានការឈឺចាប់ខុសពីធម្មតា។ ចូរធ្វើបែបនេះមួយសប្តាហ៍ម្តង។ បើអ្នកធ្វើបែបនេះរាល់ថ្ងៃ វានឹងពិបាកសំរាប់អ្នកក្នុងការសំគាល់អ្វីៗដែលប្រែប្រួល។

បើប្រអប់ដៃរបស់អ្នកមិនសូវមាន ឬ គ្មានលទ្ធភាពស្លាបពិនិត្យ : បើអ្នកមិនអាចប្រើម្រាមដៃស្លាបពិនិត្យប្រដាប់ភេទសំរាប់រកមេរោគអ្វីៗដែលប្រែប្រួល ចូរសាកល្បងប្រើកញ្ចក់ពិនិត្យមើលវាជំនួសវិញ។ បើអ្នកមិនអាចកាន់កញ្ចក់បាន ចូរដាក់វាផ្ទាល់នឹងកម្រាលផ្ទះ ហើយចោងហោងពិលើកញ្ចក់នោះដើម្បីពិនិត្យមើល។



បើអ្នកមានបួសសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នង : បើអ្នកអាចស្លាបពិនិត្យនិងមើលប្រដាប់ភេទបាន ចូរធ្វើបែបនេះមួយសប្តាហ៍ម្តងនៅពេលអ្នកកំពុងងូតទឹក។ បើអ្នកមិនអាចធ្វើបែបនេះបានដោយខ្លួនឯង ចូរស្នើសុំឱ្យនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តឱ្យគេជួយអ្នក។ អ្នកប្រហែលជាមិនដឹងឡើយ បើមានអ្វីមួយឈឺក្នុងពោះផ្នែកខាងក្រោម ឬ រមាស់ក្នុងប្រដាប់ភេទ។ ប៉ុន្តែបើអ្នកមានជំងឺកាមរោគអ្វីមួយ ហើយមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលវេលា អ្នកអាចកើតជំងឺសម្ពាធឈាមលើសស្រួចស្រាវ។ នេះជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់។ ចូរអានពីទំព័រ 117 ដល់ 119 សំរាប់វិធីព្យាបាល។

បើអ្នកមិនសូវមាន ឬ គ្មានចលនាក្នុងដើមរបស់អ្នក : បើអាចធ្វើកើត ចូរស្វែងរកស្ថានភាពដែលអ្នកអាចស្លាបពិនិត្យប្រដាប់ភេទជាមួយម្រាមដៃ ពេលអ្នកកំពុងលាងសំអាតវា ឬ ប្រើកញ្ចក់ដើម្បីពិនិត្យមើលវា។ បើចាំបាច់ ចូរស្នើសុំឱ្យនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តឱ្យគេជួយទប់ដើមរបស់អ្នកឱ្យជាប់។



រោគគ្រិនូម៉ូណូស [trichomonas]

ទ្រីកូម៉ូណូស គឺជាជំងឺកាមរោគម្យ៉ាងដែលរមាស់និងពិបាកទ្រាំបំផុត។ តាមធម្មតា វាគ្មានបង្ហាញរោគសញ្ញាលើបុរសឡើយ ប៉ុន្តែលិងរបស់បុរសដែលផ្ទុកជំងឺនេះ អាចចម្លងទៅឱ្យស្ត្រីនៅអំឡុងពេលរួមភេទ។

រោគសញ្ញា

- ធ្លាក់សមានពណ៌ប្រផេះ ឬ លឿង, សភាពជាពុះដុំៗ
- ម្តុំប្រដាប់ភេទនិងរន្ធយោនីមានពណ៌ក្រហមនិងរមាស់។
- ធ្លាក់សមានក្លិនស្អុយ។
- ឈឺផ្សារ ឬ ក្រហាយនៅពេលអ្នកជុះនោម។

បើអ្នកគ្មានលទ្ធភាពទៅធ្វើតេស្តដើម្បីដឹងឱ្យច្បាស់ថា អ្នកកើតរោគ**ទ្រីកូម៉ូណូស** ចូរលេបថ្នាំពេទ្យមួយមុខក្នុងចំណោមថ្នាំពេទ្យទាំងឡាយដែលមានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម។ បើអ្នកមិនអាចទៅធ្វើតេស្ត វាជាការប្រសើរបំផុតក្នុងការលេបថ្នាំពេទ្យដែលមានរាយឈ្មោះនៅទំព័រ 162 ពីព្រោះជំងឺឆ្លងអាចបានបង្កពីជំងឺកាមរោគផ្សេងទៀត។

ថ្នាំពេទ្យសំរាប់ព្យាបាលកាមរោគត្រីកូម៉ូណាស (trichomonas)		
ថ្នាំពេទ្យ	លេបចំនួនប៉ុន្មាន មីលីក្រាម ឬ ក្រាម?	លេបពេលណា? ប៉ុន្មានដង និង ប៉ុន្មានថ្ងៃ?
ថ្នាំ មេត្រូនីដាហ្សុល = metronidazole	400 ទៅ 500 មីលីក្រាម (mg)	លេប 2 ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។
ធូថ្នាំ មេត្រូនីដាហ្សុល = metronidazole	2 ក្រាម (grams) = (2000 mg)	លេបតែម្តងគត់ ។
(ហាមលេបថ្នាំ មេត្រូនីដាហ្សុល នៅអំឡុងពេល 3 ខែដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះ)		
ធូថ្នាំ ក្លាំងដាមីស៊ីន = clindamycin	300 មីលីក្រាម (mg)	លេប 2 ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។
សំខាន់ : ហាមផឹកគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់យ៉ាងនៅអំឡុងពេលផឹកថ្នាំ មេត្រូនីដាហ្សុល ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី មេត្រូនីដាហ្សុល , ចូរអានទំព័រ 347 ។ ដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកក៏ត្រូវការព្យាបាលដោយការផឹកថ្នាំប្រភេទនេះដូចគ្នាដែរ ។		

រោគសញ្ញាប្រមេទឹកបាយល្អក់ [gonorrhoea] និង រោគសញ្ញាប្រមេទឹកបាយថ្នាំ [chlamydia]

ជំងឺកាមរោគប្រមេទឹកបាយល្អក់ និង ប្រមេទឹកបាយថ្នាំ គឺជាជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ ។ រោគទាំងពីរនេះងាយជាសះស្បើយ បើ វាត្រូវបានព្យាបាលទាន់ពេល ។ បើរោគទាំងពីរនេះមិនបានព្យាបាល វាក្លាយទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងធ្វើឱ្យទាំងបុរស និងស្ត្រីគ្មានលទ្ធភាព ផ្តល់កំណើតកូន ។ ចំពោះបុរស រោគសញ្ញានឹងបង្ហាញឡើងក្នុងរវាងពី 2 ទៅ 5 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានរួមភេទជាមួយបុគ្គលដែលផ្ទុកមេរោគ ។ ចំពោះស្ត្រីវិញ រោគសញ្ញាប្រហែលជាមិនបង្ហាញអាចរាប់អាទិត្យ ឬ រាប់ខែ ។ ប៉ុន្តែទាំងស្ត្រីនិងបុរសអាចផ្ទុកកាមរោគទាំងនេះ ដោយ គ្មានបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ ។ ទោះបីបុគ្គលម្នាក់គ្មានបង្ហាញរោគសញ្ញាក៏ដោយ បុគ្គលនោះនៅតែអាចចម្លងកាមរោគទាំងពីរនេះ ទៅឱ្យបុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀត ។



រោគសញ្ញាទូទៅតែងបង្ហាញចំពោះស្ត្រី គឺ :-

- ធ្លាក់សមានពណ៌លឿង ឬ បៃតង ពីរន្ធយោនី ឬ រន្ធកូទ ។
- ឈឺផ្សារ ឬ ក្រហាយពេលអ្នកជុះនោម ។
- គ្រុនក្តៅ ។
- ឈឺចុកក្នុងពោះផ្នែកក្រោម ។
- ឈឺចុក ឬ ចេញឈាមនៅពេលកំពុងរួមភេទ ។
- គ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ ។

រោគសញ្ញាទូទៅតែងបង្ហាញចំពោះបុរស គឺ :-

- ធ្លាក់សចេញពីសិង្ក ។
- ឈឺផ្សារ ឬ ក្រហាយពេលអ្នកជុះនោម ។
- ឈឺផ្សារ ឬ ហើមពងស្វាស ។
- គ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ ។

ការព្យាបាល : បើអ្នកមានរោគសញ្ញាណាមួយចំពោះរោគប្រមេទឹកបាយល្អក់ ឬ រោគប្រមេទឹកបាយថ្នាំ ហើយអ្នកបាន រួមភេទដោយគ្មានប្រើស្រោមអនាម័យជាមួយបុគ្គលម្នាក់ អ្នកគិតថាខ្លួនឯងប្រហែលជាបានឆ្លងរោគណាមួយ ចូរព្យាយាមទៅធ្វើតេស្ត ដើម្បីឱ្យដឹងថាអ្នកឆ្លងជំងឺមួយណា ដូច្នេះអ្នកនឹងដឹងច្បាស់ថាត្រូវលេបថ្នាំពេទ្យប្រភេទណាមួយដើម្បីព្យាបាលរោគនៅឱ្យជាដាច់ ។

ថ្នាំពេទ្យសំរាប់ព្យាបាលរោគប្រេមេទឹកបាយល្អាក់ (gonorrhoea)		
ថ្នាំពេទ្យ	លេបចំនួនប៉ុន្មាន មីលីក្រាម ឬ ក្រាម?	លេបពេលណា? ប៉ុន្មានដង និង ប៉ុន្មានថ្ងៃ?
ថ្នាំ សេហ្វិចស៊ីម = cefixime	400 មីលីក្រាម (mg)	លេបទាំងអស់ តែម្តងគត់ ។
ឬ ថ្នាំ ស៊ីប្រូផ្លុសាក់ស៊ីន = ciprofloxacin	500 មីលីក្រាម (mg)	លេបទាំងអស់ តែម្តងដងគត់ ។

ថ្នាំពេទ្យសំរាប់ព្យាបាលរោគប្រេមេទឹកបាយថ្នាំ (chlamydia)		
ថ្នាំពេទ្យ	លេបចំនួនប៉ុន្មាន មីលីក្រាម ឬ ក្រាម?	លេបពេលណា? ប៉ុន្មានដង និង ប៉ុន្មានថ្ងៃ?
ថ្នាំ អាហ្សិត្រូមីស៊ីន = azithromycin	1 ក្រាម (g)	លេបទាំងអស់ តែម្តងគត់ ។
ឬ ថ្នាំ ដុកស៊ីស៊ីគ្លីន = doxycycline	100 មីលីក្រាម (mg)	លេប 2 ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។
ឬ ថ្នាំ ដុកស៊ីស៊ីគ្លីន = tetracycline	500 មីលីក្រាម (mg)	លេប 4 ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។
ឬ ថ្នាំ អេរីត្រូមីស៊ីន = erythromycin	500 មីលីក្រាម (mg)	លេប 4 ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។

គួរឱ្យស្តាយការធ្វើតេស្តតែងមិនងាយរកបានជានិច្ចឡើយ ដូច្នេះវាជាការប្រសើរបំផុតដែលអ្នកជំងឺត្រូវលេបថ្នាំពេទ្យ សំរាប់ជំងឺឆ្លងច្រើនប្រភេទ ។ បុគ្គលម្នាក់អាចកើតជំងឺឆ្លងចម្រុះក្នុងពេលតែមួយ មូលហេតុបានបង្កឡើងមិនត្រឹមតែរោគប្រេមេទឹកបាយល្អាក់និងប្រេមេទឹកបាយថ្នាំប៉ុណ្ណឹងឡើយ ប៉ុន្តែវាបានបង្កដោយកាមរោគទ្រីកូម៉ូណាស់ផងដែរ (ចូរអានទំព័រ 159) និងបាក់តេរីនៃយោនី (ចូរអានទំព័រ 113) ។ ថ្នាំពេទ្យសំរាប់ព្យាបាលជំងឺឆ្លងទាំងអស់នេះមានចុះឈ្មោះនៅក្នុងតារាងនៅទំព័រ 162 ។

ជំងឺរលាកអាងត្រកាក (រលាកត្រូចស្បូន) [pelvic inflammatory disease (PID)]

ជំងឺរលាកអាងត្រកាក គឺជាឈ្មោះជំងឺឆ្លងណាមួយនៃផ្នែកប្រដាប់បន្តពូជស្ត្រីក្នុងពោះផ្នែកក្រោម ។ ជារឿយៗ វាត្រូវបានហៅថា "ជំងឺរលាកក្នុងស្បូន" ។ ជំងឺរលាកក្នុងស្បូនអាចកើតមកពីជំងឺកាមរោគមួយដែលមិនដាច់ស្រឡះ ជាពិសេសរោគប្រេមេទឹកបាយល្អាក់ ឬ ប្រេមេទឹកបាយថ្នាំ ។

អ្នកប្រហែលជាមានរោគសញ្ញាមួយ ឬ ច្រើនមុខក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាទាំងនេះ :-

- ឈឺចុកក្នុងពោះផ្នែកក្រោម ។
- ត្រូវក្តៅខ្លាំង ។
- អ្នកមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួន និង ខ្សោយកំលាំង ។
- ធ្លាក់ស្បូនក្រកកដែលមានពណ៌លឿង ឬ បៃតងពីរន្ធយោនី ។
- ឈឺចាប់ ឬ ចេញឈាមពីរន្ធយោនីនៅពេលកំពុងរួមភេទ ។



ការព្យាបាល

ដោយសារតែជំងឺនេះជាទូទៅបង្កមូលហេតុពីមេរោគចម្រុះ ថ្នាំច្រើនមុខត្រូវតែប្រើដើម្បីព្យាបាលវាឱ្យជាដាច់ ។ ចូរលេបថ្នាំដែលមានចុះឈ្មោះក្នុងតារាងនៅទំព័រ 162 ។

**ថ្នាំសំរាប់ព្យាបាលជំងឺកាមរោគប្រភេទទឹកបាយនួក, ប្រភេទទឹកបាយថ្លា, ទ្រីកូឡូណាស់,
ជាក់តេរីនេយោនី និងជំងឺរលាកក្នុងស្បូន**

បើអ្នកមានរោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្លងទាំងនេះ ហើយអ្នកមិនអាចទៅធ្វើតេស្តដើម្បីដឹងឱ្យច្បាស់ថាតើជំងឺមួយណាដែលអ្នកបានឆ្លង ឬ ជំងឺឆ្លងនោះឈ្មោះអ្វី ចូរប្រើថ្នាំទាំងនេះចម្រុះគ្នា ។

ថ្នាំពេទ្យ	លេបចំនួនប៉ុន្មាន មីលីក្រាម ឬ ក្រាម?	លេបពេលណា? ប៉ុន្មានដង និង ប៉ុន្មានថ្ងៃ?
------------	-------------------------------------	----------------------------------------

ថ្នាំ សេហ្វិចស៊ីម = cefixime	400 មីលីក្រាម (mg)	លេបតែម្តងគត់ ។
ឬ ថ្នាំ ស៊ីប្រូផ្លុសាក់ស៊ីន = ciprofloxacin	500 មីលីក្រាម (mg)	លេបតែម្តងគត់ ។

(ហាមប្រើថ្នាំ ស៊ីប្រូផ្លុសាក់ស៊ីន បើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬ បំបៅដោះកូន) ។

និង

ថ្នាំ អាហ្សិត្រូមីស៊ីន = azithromycin	1 ក្រាម (gram) = 1000 មីលីក្រាម (mg)	លេបតែម្តងគត់ ។
ឬ ថ្នាំ អេរីត្រូមីស៊ីន = erythromycin	500 មីលីក្រាម (mg)	លេប 4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។
ឬ ថ្នាំ អាម៉ុកស៊ីស៊ីលីន = amoxicillin	500 មីលីក្រាម (mg)	លេប 3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។
ឬ ថ្នាំ ដុកស៊ីស៊ីគ្លីន = doxycycline	100 មីលីក្រាម (mg)	លេប 4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។

(ហាមប្រើថ្នាំ ដុកស៊ីស៊ីគ្លីន បើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬ បំបៅដោះកូន) ។

និង

ឬ ថ្នាំ តេត្រាស៊ីគ្លីន = tetracycline	500 មីលីក្រាម (mg)	លេប 4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------------

(ហាមប្រើថ្នាំ tetracycline បើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬ បំបៅដោះកូន) ។

ថ្នាំ មេត្រូនីដាហ្សុល = metronidazole	400 ទៅ 500 មីលីក្រាម (mg)	លេប 2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។
	ឬ 2 ក្រាម (grams)= 2000 មីលីក្រាម	លេបតែម្តងគត់ ។

(ចៀសវាងប្រើថ្នាំមេត្រូនីដាហ្សុល បើអ្នកមានផ្ទៃពោះ 3 ខែដំបូង ។ ចូរប្រើថ្នាំ ក្លាំងដាមីស៊ីន និង ទីនីដាហ្សុល ទាំងពីរមុខនេះជំនួសវិញ) ។

ឬ

ថ្នាំ ក្លាំងដាមីស៊ីន = clindamycin	300 មីលីក្រាម (mg)	លេប 2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។
	ឬ 5 ក្រាមនៃជាតិថ្នាំប្លូម៉ាត 2% (ពេញ 1 ស៊ីរ៉ាំងដែលភ្ជាប់មកជាមួយប្លូម៉ាត)	ដាក់ចូលរន្ធយោនី ពេលចូលដេកយប់ រៀងរាល់យប់ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។

និង ថ្នាំ ទីនីដាហ្សុល = tinidazole	2 ក្រាម (grams) = 2000 មីលីក្រាម	លេបតែម្តងគត់ ។
	ឬ 500 មីលីក្រាម (mg)	លេប 2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 5 ថ្ងៃ ។

សំខាន់ : ហាមផឹកជាតិស្រវឹងគ្រប់យ៉ាងនៅអំឡុងពេលផឹកថ្នាំ មេត្រូនីដាហ្សុល ឬ ថ្នាំ ទីនីដាហ្សុល ។ ដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកក៏ត្រូវការព្យាបាលដោយការផឹកថ្នាំប្រភេទនេះដូចគ្នាដែរ ។

ដំបៅលើប្រដាប់ភេទ [genital ulcers]

ដំបៅលើប្រដាប់ភេទទាំងអស់ដែលកើតនៅលើប្រដាប់ភេទ គឺជាជំងឺកាមរោគ ប៉ុន្តែដំបៅគ្រែ, បូស ឬ រលូសនានា ក៏អាចក្លាយជា ដំបៅលើប្រដាប់ភេទដែរ ។ ដំបៅលើប្រដាប់ភេទណាមួយក៏ដោយ គួរត្រូវថែទាំដោយលាងសំអាតជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាត ។ ជួតផ្គិត វាឱ្យស្ងួតដោយប្រយ័ត្ន ។ កំណាត់ ឬ កន្ទួបដែលអ្នកប្រើសំរាប់ជូតសំអាតដំបៅ ចូរចោកក់វាឱ្យស្ងួតមុនពេលសមាជិកផ្សេងទៀតយក វាទៅប្រើម្តងទៀត ។ បើអាច អ្នកកើតជំងឺស្វាយគួរប្រើកន្សែង, កន្ទួប និងវត្ថុលាងសំអាតដំបៅដាច់ដោយឡែកពីអ្នកគ្មានជំងឺ ។



ចំរាម : កាលណាបុគ្គលម្នាក់កើតដំបៅលើប្រដាប់ភេទ វាជារឿងងាយក្នុងការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗទៀតតាមរយៈដំបៅនេះ ជា ពិសេសវិរុសហ៊ីវ និង ជំងឺធ្មេមប្រភេទ បេ ។ ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង ចូរចៀសវាងការរួមរក្សាទាល់តែដំបៅនោះជាសះស្បើយ ។

រោគស្វាយ [syphilis]

រោគស្វាយ គឺជាជំងឺកាមរោគកាចសាហាវដែលរាតត្បាតរាងកាយទាំងមូល ។ វាអាចកើតនៅក្នុងខ្លួនរាប់ឆ្នាំ ហើយកាន់តែដុះ ដាបឡើងៗជានិច្ច ។ រោគស្វាយអាចជាដាច់ស្រឡះ បើព្យាបាលវាទាន់ពេល ។

រោគសញ្ញា

1. រោគសញ្ញាដំបូង គឺកើតដំបៅតូចមួយមិនឈឺអ្វីឡើយ ហើយមើលទៅដូចកើតមុន, ពងបែក, ឬសរាបតែសើម ឬ ដំបៅបើកមុខ ។ ដំបៅនេះកើតប្រមាណតែពីរ-បីថ្ងៃ ឬ ពីរ-បីអាទិត្យ ប៉ុណ្ណោះ ហើយរាបបាត់វិញដោយខ្លួនវា ។ ប៉ុន្តែជំងឺនេះបន្តរាលដាលពេញរាងកាយ ។



2. រាប់អាទិត្យ ឬ រាប់ខែក្រោយមក បុគ្គលកើតរោគស្វាយអាចកើតជំងឺរលាកបំពង់ក, ក្តៅស្រៀវស្រាញតិច តួច, ពងបែកក្នុងមាត់, ហើមសន្លាក់ឆ្អឹង ឬ កើតកន្ទួលរមាស់ ជាពិសេសលើបាតដៃនិងបាតជើង ។ អំឡុង ពេលនេះ បុគ្គលកើតរោគស្វាយអាចចម្លងរោគដល់អ្នកដទៃទៀត ។
3. តាមធម្មតារោគសញ្ញាទាំងនេះនឹងក្រាបបាត់ទៅវិញរយៈកាល ប៉ុន្តែជំងឺនេះនៅតែបន្តផុកក្នុងខ្លួន ។ បើគ្មាន ការព្យាបាល រោគស្វាយអាចបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺបេះដូង, ស្វិតអវៈយវៈ, ខូចខួរក្បាល, និងស្លាប់ ។

ការព្យាបាល - សំរាប់ការព្យាបាលរោគស្វាយឱ្យដាច់ស្រឡះ ការព្យាបាលឱ្យចប់ចុងចប់ដើមគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់

- **បើរោគសញ្ញាបង្ហាញឡើងមានរយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ** ត្រូវចាក់ថ្នាំ **បេនហ្សាទីន ប៉េនីស៊ីលីន** (benzathine penicillin) ចំនួនទាំងអស់ **2.4 លានយូនីត** តែត្រូវរំលែកថ្នាំពាក់កណ្តាលចាក់ត្រីតាកម្លាង និងពាក់កណ្តាលទៀតចាក់ត្រីតាកម្លាង ទៀត ។ បុគ្គលដែលប្រតិកម្មថ្នាំ **ប៉េនីស៊ីលីន** (penicillin) ចូរលេបថ្នាំ **តេត្រាស៊ីគ្លីន** ជំនួសវិញ គឺផឹកចំនួន **500 មីលីក្រាម** 4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 15 ថ្ងៃ ។
- **បើរោគសញ្ញាបង្ហាញឡើងលើសពីមួយឆ្នាំ** ត្រូវចាក់ថ្នាំ **បេនហ្សាទីន ប៉េនីស៊ីលីន** ម្តងចំនួន **2.4 លានយូនីត** ត្រូវរំលែកថ្នាំ ពាក់កណ្តាលចាក់ត្រីតាកម្លាង និងពាក់កណ្តាលទៀតចាក់ត្រីតាកម្លាងទៀត-ថ្នាំនេះត្រូវចាក់ 1 អាទិត្យម្តង សំរាប់ 3 អាទិត្យជាប់គ្នា (ចំនួនថ្នាំសរុប **7.2 លានយូនីត**) ។ បើមានប្រតិកម្មថ្នាំ **ប៉េនីស៊ីលីន** ចូរលេបថ្នាំ **តេត្រាស៊ីគ្លីន** ជំនួសវិញ គឺផឹកចំនួន **500 មីលីក្រាម** 4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 30 ថ្ងៃ ។

កំណត់ចំណាំ : ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ឬ ដំបៅដោះកូន បើសិនជាគាត់ប្រតិកម្មនឹងថ្នាំ **ប៉េនីស៊ីលីន** គាត់អាចផឹកថ្នាំ **អេរីត្រូមីស៊ីន** ជំនួសវិញ (ចូរអានទំព័រ 343) ។ ប្តី/ដៃគូរបស់គាត់ ក៏ត្រូវការការព្យាបាលឱ្យចប់ចុងចប់ដើមផងដែរ ។

ការមានផ្ទៃពោះ និង រោគសញ្ញា


ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចចម្លងរោគសញ្ញាទៅឱ្យទារកដែលមិនទាន់កើត ដែលអាចបណ្តាលឱ្យទារកកើតមិនគ្រប់ខែ, ទារកអាចខូចរាងកាយ, ឬ ទារកអាចស្លាប់ ។ អ្នកអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដោយការទៅធ្វើតេស្តឈាម និងធ្វើការព្យាបាលនៅពេលកំពុងមានផ្ទៃពោះ ។ បើអ្នកនិងប្តី/ដៃគូរបស់អ្នកបានធ្វើតេស្តឈាម ហើយបង្ហាញថាអ្នកកើតរោគសញ្ញាពិតមែននោះ អ្នកនិងប្តី/ដៃគូរបស់អ្នកត្រូវតែព្យាបាលជាមួយថ្នាំពេទ្យគឺចាក់ចូលសាច់ដុំ មួយអាទិត្យម្តងៗ សំរាប់ 3 អាទិត្យជាប់គ្នា ។

រោគទាមទ្យា [Chancroid]

រោគទាមទ្យា គឺជាជំងឺកាមរោគម្យ៉ាងដែលបង្កឱ្យកើតដំបៅលើប្រដាប់ភេទ ។ វាអាចជាសះស្បើយ បើព្យាបាលទាន់ពេល ។ រោគទាមទ្យាងាយច្រឡំនឹងរោគសញ្ញា ។

សញ្ញារោគទាមទ្យា

- ដំបៅលើប្រដាប់ភេទ ឬ រន្ធកូទ មានសភាពជាពងទន់មួយ ឬ ច្រើន ឈឺខ្លាំងពិបាកទ្រាំ ហើយងាយចេញឈាម ។
- ក្រពេញរីកធំ និងឈឺចាប់ខ្លាំងអាចបង្កឡើងកូនកណ្តុរក្នុងគ្រលៀន ។
- គ្រុនក្តៅតិចតួច ។




ទាមទ្យា

ថ្នាំសំរាប់ព្យាបាលការរោគទាមទ្យា		
ថ្នាំពេទ្យ	លេបចំនួនប៉ុន្មាន មីលីក្រាម ឬ ក្រាម?	លេបពេលណា? ប៉ុន្មានដង និង ប៉ុន្មានថ្ងៃ?
ថ្នាំ អាហ្សីត្រូម៉ូស៊ីន = azithromycin	1 ក្រាម (g)	លេបទាំងអស់តែម្តងគត់ ។
ឬ ថ្នាំ អេរីត្រូម៉ូស៊ីន = erythromycin	500 មីលីក្រាម (mg)	លេប 4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 7 ថ្ងៃ ។
ឬ ថ្នាំ ស៊ីប្រូផ្លុសាក់ស៊ីន = ciprofloxacin	500 មីលីក្រាម (mg)	លេប 2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំរាប់ 3 ថ្ងៃ ។
(ហាមប្រើថ្នាំ ស៊ីប្រូផ្លុសាក់ស៊ីន បើអ្នកមានផ្ទៃពោះ) ។		
ចំណាំ : បើអ្នកពុំអាចដឹងឱ្យពិតប្រាកដថា ដំបៅដែលអ្នកកើតនោះបានបង្កដោយរោគទាមទ្យា ឬ បើអ្នកមិនអាចទៅធ្វើតេស្តបាន ជាការប្រសើរបំផុតនោះ អ្នកក៏ត្រូវការផឹកថ្នាំព្យាបាលរោគសញ្ញាផងដែរ (មូរអានទំព័រ 163) ។		

ជំងឺរើមលើប្រដាប់ភេទ [genital herpes]

ជំងឺរើមកើតលើប្រដាប់ភេទ គឺជាជំងឺកាមរោគដែលបានបង្កដោយវិរុសមួយ ។ ពងបែកតូចៗដែលកើតឡើងលើប្រដាប់ភេទ គឺត្រូវបានឆ្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតក្នុងពេលកំពុងរួមរក្ស ។ ជារឿយៗជំងឺរើមកើតលើប្រដាប់ភេទ អាចឆ្លងទៅកើតលើ មាត់ដោយសារការរួមភេទតាមមាត់ ។ (ជំងឺរើមប្រភេទនេះ គឺខុសគ្នាពីជំងឺរើមធម្មតាដែលកើតលើមាត់ ព្រោះវាមិនឆ្លងពេលកំពុង រួមរក្ស) ។ វិរុសនៃជំងឺរើមអាចបណ្តាលឱ្យកើតដំបៅដែលជាហើយកើតមកវិញៗ ហើយវាអាចសើរើបែបនេះរាប់ខែ ឬ ឆ្នាំ ។ ជំងឺរើម គ្មានវិធីព្យាបាលឱ្យជាដាច់ស្រឡះឡើយ ប៉ុន្តែមានការព្យាបាលដែលអាចជួយឱ្យអ្នកបានធូរស្រាល ។



រោគសញ្ញា

- មានអារម្មណ៍ថាត្រីស្រគ្រៀវ, រមាស់, ឬ ឈឺលើស្បែកមុំប្រដាប់ភេទ ឬ ភ្លៅ ។
- ពងបែកទឹកថ្លាៗដែលឈឺខ្លាំង មើលទៅដូចដំណក់ទឹកស្រក់លើស្បែក ។ ពងទឹកថ្លាៗទាំងនេះ នឹងបែក ហើយបង្កទៅជាដំបៅបើកមុខដែលឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង ។

លើកដំបូងដែលអ្នកកើតដំបៅពីជំងឺរើម វាអាចកើតអស់រយៈពេលបីអាទិត្យ ឬ លើសពីនេះ ។ អ្នកអាចមានអាការៈគ្រុនក្តៅ, ឈឺក្បាល, ឈឺពេញរាងកាយ, ត្រីរងា, និងហើមថ្នាំងជាលិកាក្នុងក្រលៀន ។ ថ្ងៃបើដំបៅនេះជាដាច់ទៅវិញក្តី ជំងឺឆ្លងនេះមិនជាដាច់ទេ ។ ប៉ុន្តែពេលដំបៅកើតលើកក្រោយទៀតៗ វានឹងមិនសូវខ្លាំងឡើយ ។

ការព្យាបាល : ចូរប្រើថ្នាំ **អាស៊ីក្លូវិរ** (acyclovir) សូមអានទំព័រ 333 ។

ការមានផ្ទៃពោះនិងជំងឺរើម [Pregnancy and Herpes]

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលកើតជំងឺរើមនិងដំបៅនៅអំឡុងពេលសម្រាលកូន អាចចម្លងវិរុសនេះដល់ ទារករបស់នាង ។ ករណីនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារករបស់នាង ជាពិសេសបើម្តាយកើតដំបៅពីជំងឺនេះ លើកទីមួយ ។ បើម្តាយធ្លាប់កើតជំងឺរើមរួចហើយ ករណីរងគ្រោះចំពោះទារកគឺមានតិចតួច ។ បើអ្នកកើត ដំបៅពីជំងឺរើម ចូរព្យាយាមទៅសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យ ។ វេជ្ជបណ្ឌិតប្រហែលជារក្សាកាត់យកទារកចេញ (ចូរអានទំព័រ 244 សំរាប់ការរក្សាកាត់យកទារកចេញ) ធ្វើដូច្នោះទារកមិនឆ្លងជំងឺពីដំបៅនោះ ឬ វេជ្ជបណ្ឌិត ផ្តល់ថ្នាំពេទ្យដល់ទារកក្រោយពេលទារកកើតមក ។



បួសដុះលើប្រដាប់ភេទ [genital warts or human papilloma virus (HPV)]

បួសដុះលើប្រដាប់ភេទ គឺបានបង្កពីវិរុសហៅថា **វិរុសប៊ីប៊ីឡូម៉ាណៃមនុស្ស** (HPV) ។ វិរុសទាំងនេះមានទ្រង់ទ្រាយដូចបួសដុះ លើផ្នែកផ្សេងទៀតលើរាងកាយដែរ ។ វាគឺអាចទៅរួចដែលបុគ្គលម្នាក់អាចផ្ទុក**វិរុសប៊ីប៊ីឡូម៉ាណៃមនុស្ស** ហើយមិនបានដឹង ជាពិសេស បើបួសនេះដុះខាងក្នុងរន្ធយោនី ឬ ដុះក្នុងចុងលិង្គ ។ ហើយមនុស្សខ្លះទៀតដែលផ្ទុក**វិរុសប៊ីប៊ីឡូម៉ាណៃមនុស្ស** មិនមានដុះបួសអ្វីសោះ ។ បួសនេះប្រហែលជាវាលាយបាត់ទៅវិញដោយគ្មានការព្យាបាល ប៉ុន្តែករណីនេះអាចទាមទារពេលយូរអងែង ។ តាមធម្មតាវិរុសនិងបួស ទាំងនេះរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងបន្តទៅទៀត និងត្រូវតែព្យាបាលឱ្យជាដាច់ ។ **វិរុសប៊ីប៊ីឡូម៉ាណៃមនុស្ស** ងាយឆ្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គល ម្នាក់ទៀតនៅអំឡុងពេលរួមរក្ស ។


សំខាន់ : បើបួសដុះលើប្រដាប់ភេទមិនបានព្យាបាល បួសខ្លះអាចបង្កឱ្យកើតជំងឺមហារីកនៃកស្សួន ។ បើអ្នកមានបួសដុះ លើប្រដាប់ភេទ ចូរព្យាយាមទៅធ្វើតេស្ត**ប៉ាប** (អានទំព័រ 131) ដើម្បីឱ្យដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកមានរោគសញ្ញាអ្វីមួយដែលទាក់ទងនឹង **វិរុសប៊ីប៊ីឡូម៉ាណៃមនុស្ស** ឬ ជំងឺមហារីក ។

រោគសញ្ញានៃវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ (HPV)

- រមាស់
- ដុំពកមានពណ៌សក្បួល ឬ ពណ៌កាហ្វេ ឈឺតិចៗ ហើយមានសភាពគ្រាតនៅផ្ទៃខាងលើ ។

ចំពោះស្ត្រី តាមធម្មតាដុំពកៗទាំងនេះដុះត្រង់ស្បែកដែលជាប្រជុំវិញទ្វារយោនីដល់ខាងក្នុង រន្ធយោនី និងជុំវិញរន្ធកូទ។

ចំពោះបុរសវិញ តាមធម្មតាដុំពកៗទាំងនេះដុះលើលិង្គ ឬ ខាងក្នុងចុងលិង្គបន្តិច និងដុះលើពងស្វាស ឬ រន្ធកូទ។



ការព្យាបាល

តាមធម្មតាសំភារៈនិងឱសថសំរាប់ព្យាបាលប្លូស អាចរកទិញបាននៅតាមឱសថស្ថាន ឬ ហាងលក់ជាតិគីមី ។

1. ចូរលាបក្រមួនប្រេងកាត (**វ៉ាស៊ីលីន**) ឬ ប៉ូម៉ាតជាតិប្រេងលើស្បែកជុំវិញប្លូសនីមួយៗ ដើម្បីការពារស្បែកគ្មានជំងឺ ។
2. ចូរប្រើឈើតូចមួយ ឬ ឈើចាក់ធ្មេញឆ្លុះយកជាតិ**អាស៊ីត ទ្រីក្លរូសេតិច** [trichloroacetic acid (TCA)] ឬ ជាតិ**អាស៊ីត ប៊ីក្លរូសេតិច** [bichloroacetic acid (BCA)] ដែលជាក្រុមព្យាបាលប្លូសចំនួន 80% ទៅ 90% ដាក់ឱ្យចំបូស ។ ចូរទុកជាតិអាស៊ីតនៅលើប្លូសនោះទាល់តែប្លូសនោះទៅជាពណ៌ស ។
3. ពីរម៉ោងក្រោយមក ឬ រាប់ជាងនេះបើជាតិអាស៊ីតធ្វើឱ្យអ្នកឈឺផ្សារខ្លាំងទ្រាំលែងបាន ចូរលាងសំអាតវាចេញ ។

ឬ

ចូរលាបជាតិក្រុម**ប៉ូដូហ្វីលីន** [podophyllin] ចំនួន 20% តាមវិធីដូចគ្នាទាល់តែប្លូសនោះទៅជាពណ៌កាហ្វេ (ចូរអានទំព័រ 351) ។ ចំនួន 6 ម៉ោងក្រោយមក ត្រូវលាងសំអាតជាតិក្រុម**ប៉ូដូហ្វីលីន** ចេញ ។

ជាតិអាស៊ីតគួរតែដុតសំលាប់ប្លូសនោះដោយបន្ទុល់នូវដំបៅដែលឈឺខ្លាំងត្រង់កន្លែងប្លូសបានដុះ ។ ចូរថែទាំដំបៅនោះឱ្យស្អាត និងស្ងួតជានិច្ច ។ ដំបៅទាំងនោះគួរតែជាសះស្បើយនៅអំឡុងពេលមួយ ឬ ពីរអាទិត្យក្រោយមក ។ ចូរថែទាំពិនិត្យឱ្យជិតដល់ដើម្បីកុំឱ្យដំបៅនោះក្លាយ ។ ចូរព្យាយាមកុំរួមភេទទាល់តែដំបៅទាំងនោះជាដាច់ ប៉ុន្តែបើអ្នកត្រូវតែរួមភេទ ដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកត្រូវតែពាក់ស្រោមអនាម័យ ។

ធម្មតាការព្យាបាលពី-បីរយ៉ាង គឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីបំបាត់ប្លូសទាំងអស់ (វាគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ថាអ្នកត្រូវប្រើដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីព្យាបាលប្លូស) ។ មួយអាទិត្យក្រោយមក អ្នកអាចធ្វើការព្យាបាលជាថ្មីម្តងទៀត ។ ព្យាយាមកុំឱ្យជាតិអាស៊ីតប៉ះពាល់ដំបៅដែលជាកន្លែងប្លូសបានដុះពីមុន ។ បើវារលាកខ្លាំង រង់ចាំឱ្យមួយអាទិត្យកន្លងហួសសិន ហើយធ្វើការព្យាបាលម្តងទៀត ។



ការមានផ្ទៃពោះ និង ប្លូស [Pregnancy and warts]

ហាមប្រើជាតិក្រែមប៉ូដូហ្វីលីន (podophyllin) នៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ព្រោះវានឹងជ្រាបចូលក្នុងស្បែករបស់អ្នក ហើយអាចបង្កទុក្ខទោសដល់ទារកដែលកំពុងលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃ។ ប្លូសអាចរាលដាលនិងធ្វើឱ្យធ្លាក់ឈាមនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ប៉ុន្តែប្លូសទាំងនោះផ្ទាល់នឹងមិនបង្កទុក្ខទោសដល់ទារកឡើយ។ ជួនកាលប្លូសទាំងនោះនឹងរួមតូចទៅៗ ក្រោយពិសម្រាលកូនហើយ។


ជំងឺឆ្អែម (ខាសំលៀង, ភ្នែកល្បឿង) [Hepatitis (jaundice, yellow eyes)]

ជំងឺឆ្អែមគឺជាបញ្ហារលាកឆ្អែម តាមធម្មតាបង្កដោយវីរុសមួយ ប៉ុន្តែក៏បង្កដោយបាក់តេរី, ជាតិស្រវឹង, ឬ ជាតិគីមីពុលផងដែរ។ ជំងឺឆ្អែមបែងចែកជា 3 ប្រភេទ (អា, បេ, និង សេ) ហើយវាអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត ទោះបីជាមាន ឬ គ្មានរោគសញ្ញានៃជំងឺក៏ដោយ។

តាមធម្មតាជំងឺឆ្អែមប្រភេទ **អា** បើកើតចំពោះកុមារគឺមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរឡើយ ហើយជាញឹកញយជំងឺឆ្អែមប្រភេទ**អា** តែងតែធ្ងន់ធ្ងរបើវាកើតចំពោះមនុស្សពេញវ័យ និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។

ជំងឺឆ្អែមប្រភេទ **បេ** គឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប។ វាអាចឈានដល់ការខូចឆ្អែមមួយជីវិត (ជំងឺក្រិនឆ្អែមដោយសារជាតិស្រវឹងច្រើនពេក), ជំងឺមហារីកឆ្អែម និងស្លាប់ផងដែរ។ ដូច្នេះបើអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយមានរោគសញ្ញាជំងឺឆ្អែមប្រភេទ**បេ** ចូរទៅសុំយោបល់ព្យាបាលពីផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។

ជំងឺឆ្អែមប្រភេទ **សេ** ក៏មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែរ ហើយអាចឈានដល់ការរលាកឆ្អែមទៀតផង។ ជំងឺឆ្អែមប្រភេទ**សេ** គឺជាមូលហេតុចម្បងចំពោះការស្លាប់របស់មនុស្សដែលផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ/កើតអេដស៍។



រោគសញ្ញា

- អស់កំលាំងនិងមានអារម្មណ៍ខ្សោយ។
- ហូបម្ហូបអាហារមិនបាន ឬ មិនឃ្នាន។
- ភ្នែក និង/ឬ ស្បែកលឿង (ជាពិសេសបាតដៃនិងបាតជើង)។
- ឈឺក្នុងពោះ ឬ មានអាការៈក្អួតចង្កោរ។
- ទឹកនោមមានពណ៌ចាស់ ហើយលាមកមើលទៅមានពណ៌ស។
- ជួនកាលកើតជំងឺគ្រុនក្តៅ។
- គ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់។

ការព្យាបាល

វាគ្មានថ្នាំណាមួយអាចជួយបានឡើយ ។ ការពិត ការលេបថ្នាំមួយចំនួនអាចធ្វើឱ្យធ្លើមខូចកាន់តែខ្លាំងឡើង ។ ចូរសម្រាក និង ផឹកទឹកឱ្យច្រើន ។ បើអ្នកមិនឃ្លាន ចូរព្យាយាមផឹកទឹកផ្លែឈើ, ទឹកស៊ីបដែលបានពិទឹកស្វោរសាច់ ឬ បន្លែ ។ ដើម្បីត្រួតត្រាកុំឱ្យក្អួត ចូរផ្សើមបំពង់កជាមួយទឹកខ្លី ឬ ទឹកកូឡា ។ ការផឹកទឹកតែដែលបានផលិតពីរុក្ខជាតិ គ្រឿងទេសដូចជា ស្លឹកផ្កាកាំម៉ូម្យែល ក៏អាចជួយឱ្យបានច្រើនដែរ ។ ចូរស្នើសុំយោបល់ពីចាស់ទុំនៅក្នុង សហគមន៍របស់អ្នក ថាតើរុក្ខជាតិប្រភេទណាស់គិតទិញបំផុតដើម្បីយកវាមកដាំធ្វើទឹកតែដើម្បីផឹក ។




កាលណាអ្នកមានអារម្មណ៍មិនឃ្លានអ្វីសោះ ហាមហូបជាតិប្រូតេអ៊ីនពីសត្វ (សាច់, ត្រី, ស៊ីត) ពីព្រោះវាធ្វើឱ្យធ្លើមដែលខូចប្រឹងធ្វើការខ្លាំងពេក ។ ចៀស វាងម្ហូបអាហារដែលចម្អិនដោយប្រើខ្លាញ់សត្វ ឬ ប្រេងឆា ។ ចូរហូបផ្លែឈើ និងបន្លែស្រស់ ឬ បន្លែចម្រុះដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនតិចជំនួសវិញ ។ ហាមផឹក គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ យ៉ាងតិចណាស់ក៏ 6 ខែដែរ ។

ការទប់ស្កាត់

វីរុសនៃជំងឺធ្លើមទាំងពីរប្រភេទ **បេ** និង **សេ** អាចឆ្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតតាមរយៈការរួមភេទ, ការចាក់ថ្នាំដែល ប្រើមូលគ្មានអនាម័យ, ការបញ្ចូលឈាមដែលផ្ទុកវីរុស, ហើយអាចឆ្លងពីម្តាយទៅទារកក្នុងពេលម្តាយកំពុងសម្រាលកូន ។ ដើម្បីទប់ ស្កាត់មិនឱ្យឆ្លងជំងឺធ្លើមទៅមនុស្សដទៃទៀត ចូរប្រើស្រោមអនាម័យជានិច្ចនៅពេលរួមភេទ (អានពីទំព័រ 181 ដល់182 និងពីទំព័រ 189 ដល់ 192) ហើយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែស្វែងរកឧបករណ៍ដើម្បីសំលាប់មេរោគមុនពេលប្រើដូចជា ស៊ីរ៉ាំង, មូល និងឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើ ដើម្បីកាត់ ឬ ដេរស្បែក ដូចជា (មូលសាក់ស្បែក, វះកាត់ស្បែកចុងលិង្គ, វះកាត់ដេរសំលាក, វះកាត់ប្រដាប់ភេទស្រ្តី) ។ល។

វីរុសធ្លើមប្រភេទ **អា** ឆ្លងពីលាមកនៃបុគ្គលម្នាក់ទៅមាត់ របស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតតាមរយៈទឹកមិនស្អាត ឬ ម្ហូបអាហារគ្មាន អនាម័យ ។ ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំអ្នកដទៃទៀតកើតជំងឺ វាជាការសំខាន់ត្រូវ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអ្នកជំងឺបន្ទោរបង់លាមកក្នុងបង្គន់ ឬ កន្ត្រែកនិងចាក់ ចោលក្នុងបង្គន់ ឬ កប់ចោលឱ្យឆ្ងាយ ហើយធ្វើយ៉ាងណាលាងសំអាត អ្នកជំងឺឱ្យស្អាតជានិច្ច ។ មនុស្សគ្រប់គ្នា ទាំងអ្នកជំងឺ, ទាំងសមាជិក គ្រួសារ និងអ្នកថែទាំ ត្រូវតែព្យាយាមថែទាំខ្លួនឱ្យស្អាតជានិច្ច និង លាងដៃរបស់ខ្លួនឱ្យញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាត ។



បច្ចុប្បន្ននេះមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងសំរាប់ការពារជំងឺធ្លើមប្រភេទ **អា** និង **បេ** ប៉ុន្តែថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះប្រហែលជាថ្លៃណាស់ ឬ មិន អាចរកបានគ្រប់តំបន់ឡើយ ។ បើអ្នកមានលទ្ធភាព ចូរទៅចាក់ថ្នាំ វ៉ាក់សាំងមួយនៅអំឡុងពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះ វានឹងជួយទប់ស្កាត់វីរុសមិនឱ្យឆ្លងទៅទារករបស់អ្នក ។

វិធីដែលគ្រូអាចធ្វើដើម្បីរកមានជំងឺកាមរោគ

បើអ្នក ឬ ដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកមានរោគសញ្ញាកាមរោគ :-

- ចាប់ផ្តើមព្យាបាលជាបន្ទាន់ ។ ការព្យាបាលទាន់ពេលវេលានឹងការពារអ្នកពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតនៅពេលខាងមុខ ហើយទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺទៅឱ្យបុគ្គលផ្សេងទៀត ។
- ទៅធ្វើតេស្ត បើអាចធ្វើបាន ។ ចូរទៅគ្លីនិក ឬ មណ្ឌលសុខភាពកន្លែងដែលអ្នក ទទួលបានការធ្វើតេស្តដើម្បីឱ្យដឹងថា អ្នកកើតជំងឺកាមរោគណាមួយ ។ តាមវិធី នេះ អ្នកមិនចាំបាច់លេបថ្នាំដែលអ្នកមិនត្រូវការ ។ បើអ្នកគ្មានវិធីណាអាច ទទួលបានការធ្វើតេស្ត អ្នកប្រហែលជាត្រូវលេបថ្នាំពីរ-បីមុខចូលគ្នា ។ ចូរ ព្យាយាមនិយាយជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលមានជំនាញអំពីការព្យាបាល ។
- ចូរជួយដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកឱ្យទទួលបានការព្យាបាលក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានឹងអ្នក ។ បើគាត់មិនបានព្យាបាល គាត់នឹងចម្លងជំងឺនោះឱ្យអ្នកម្តងទៀត បើអ្នកមានការរួមរក្សា ។ ចូរជួយជំរុញឱ្យគាត់លេបថ្នាំ ត្រឹមត្រូវ ឬ ទៅជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ ។
- ចូរធ្វើឱ្យប្រាកដថា អ្នកត្រូវតែលេបថ្នាំទាំងនោះឱ្យចប់សព្វគ្រប់ ថ្វីបើរោគសញ្ញានោះចាប់ផ្តើមជាប់ទៅវិញក៏ដោយ ។ ហាមទិញថ្នាំតែមួយផ្នែក ។ អ្នក ឬ ដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកនឹងមិនដាច់ស្រឡះឡើយ ដរាបណាអ្នកនិងដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកបាន លេបថ្នាំគ្រប់ចំនួនកំណត់ (ចូរអានទំព័រ 327) ។ ចូរអនុវត្តការរួមរក្សាដែលមានសុវត្ថិភាព ។ បើអ្នកមិនការពារខ្លួនឯង ជានិច្ចជាកាល អ្នកអាចឆ្លងជំងឺកាមរោគមួយទៀត (ចូរអានទំព័រ 180 ដល់ 182) ។



តើអ្វីទៅជាវិរុសអ៊ីដ/អេដស៍? [HIV/AIDS]

វិរុសហ៊ីវ (វិរុសបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពាររោគក្នុងរាងកាយមនុស្ស) គឺជាមេរោគល្អិតៗមិនអាចមើលឃើញដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធ ការពាររោគក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកចុះខ្សោយ ផ្នែកនៃរាងកាយដែលទប់ស្កាត់ប្រឆាំងជំងឺនិងរោគឆ្លងទាំងឡាយ ។ ភាគច្រើនបំផុត វិរុសហ៊ីវឆ្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតនៅអំឡុងពេលរួមរក្សា ។ បើបុរសម្នាក់ចម្លងវិរុសហ៊ីវដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ ឬ បើស្ត្រី មានផ្ទៃពោះម្នាក់បានផ្ទុកវិរុសហ៊ីវរួចហើយនោះ វិរុសក៏អាចឆ្លងទៅទារកផងដែរនៅអំឡុងពេលស្រ្តីកំពុងមានផ្ទៃពោះ, អំឡុងពេល ស្រ្តីសម្រាលកូន, ឬ អំឡុងរយៈពេលស្រ្តីបំបៅដោះកូន ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបុគ្គលម្នាក់អាច ឬ មិនអាចឆ្លងវិរុសហ៊ីវ ចូរអានទំព័រ 170 ដល់ 171 ។


អេដស៍ (ប្រព័ន្ធការពាររោគបានចុះខ្សោយដោយសហនិមិត្តហេតុ) គឺជាជំងឺដែលបានកើតមួយរយៈ ពេលមកហើយ បន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានផ្ទុកវិរុសហ៊ីវរួចហើយ ។ យើងអាចនិយាយបានថា អ្នកកើតជំងឺអេដស៍ គឺនៅពេលបុគ្គលនោះចាប់មានបញ្ហាសុខភាពទូទៅញឹកញាប់ច្រើនជាងធម្មតា ។ រោគសញ្ញានៃជំងឺអេដស៍មួយ ចំនួនគឺស្រកទំងន់, កើតដំបៅដែលមិនដាច់, ក្អកខ្លាំង, បែកញើសជោគៗពេលយប់, រាករូស, កើតកន្ទួល រមាស់ស្បែក, គ្រុនក្តៅ, ធ្លាក់សពីរន្ធយោនី, ឬ អស់កំលាំងល្អិតល្អៃគ្រប់ពេល ។ ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនេះអាចបាន បង្កពីមូលហេតុផ្សេងៗទៀត ។ អ្នកពុំអាចដឹងប្រាកដថាបុគ្គលម្នាក់មានវិរុសហ៊ីវ/ អេដស៍ដោយគ្មានការធ្វើការ ពិនិត្យឈាមតាមវិធីធ្វើតេស្តពិសេសឡើយ ចូរអានទំព័រ 172 ។



ដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារភេទរបស់បុគ្គលដែលផ្ទុកវីរុសហ៊ីវបានចុះខ្សោយបន្តិចម្តងៗជាមួយនឹងជំងឺនីមួយៗ ដូច្នេះហើយ រាងកាយបុគ្គលនោះមានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ និងទ្រទ្រង់រាងកាយឱ្យគ្រាន់បើឡើងវិញ ។ បញ្ហានេះនឹងចេះតែកើត មានទាល់តែរាងកាយបុគ្គលនោះខ្សោយរលែងត្រដវរស់តទៅទៀតបាន ហើយបុគ្គលនោះនឹងបាត់បង់ជីវិត ។ មនុស្សណាក៏ដោយអាច ឆ្លងវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ រួមទាំងជនពិការ និង ជនមិនពិការផងដែរ ។

មនុស្សខ្លះស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍យ៉ាងលឿនបំផុត ក្រោយពីបានផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ ។ ប៉ុន្តែសំរាប់មនុស្សជាច្រើននាក់បានផ្ទុក វីរុសហ៊ីវរាប់ឆ្នាំ ទើបពួកគេចាប់ផ្តើមយឺតយ៉ាវដោយសារជំងឺអេដស៍ ។ នេះមានន័យថា បុគ្គលម្នាក់អាចផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ ហើយពុំបានដឹងដោយ សារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមាំមួន ។ ទោះជាពួកគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេអាចចម្លងវីរុសហ៊ីវដល់បុគ្គលម្នាក់ ទៀតយ៉ាងឆាប់បំផុតក្នុងពេលដែលពួកគេបានផ្ទុកវីរុសនោះភ្លាមៗ ។ វិធីដែលអាចដឹងឱ្យច្បាស់ថាអ្នកផ្ទុកវីរុសមានតែម្យ៉ាងគត់ គឺធ្វើ តេស្តឈាមរបស់អ្នក ។ ការធ្វើតេស្តឈាមអាចធ្វើបាននៅឯគ្លីនិក និង មន្ទីរពេទ្យនានា ។



ថ្នាំពេទ្យហៅថា **អង់ទីរេត្រូវីវ៉ាល់** [antiretrovirals (ARVs)] អាចជួយពន្យារពេលដល់មនុស្ស ផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ឱ្យរស់នៅបានយូរ និងទ្រទ្រង់សុខភាពបានគ្រាន់ប្រើជាងមុន ។ ថ្នាំទាំងនេះមិនបាន សំលាប់វីរុសហ៊ីវ ឬ ធ្វើឱ្យជំងឺអេដស៍ជាសះស្បើយឡើយ ប៉ុន្តែវាជួយសម្រួលឱ្យអ្នករស់នៅបានស្រួល ជាងមុនជាមួយនឹងជំងឺនេះ ។ ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ការទទួលបានថ្នាំ **អង់ទីរេត្រូវីវ៉ាល់** អាចទប់ស្កាត់ វីរុសហ៊ីវមិនឱ្យឆ្លងពីម្តាយទៅកូនក្នុងផ្ទៃ ។ វាក៏គួរឱ្យស្តាយ ថ្នាំ**អង់ទីរេត្រូវីវ៉ាល់** អាចផ្ត្រែខ្លាំងណាស់ និង ប្រហែលជាពិបាករកបាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន ។ សំរាប់ព័ត៌មានអំពីថ្នាំ**អង់ទីរេត្រូវីវ៉ាល់** ចូរអានទំព័រ 176 ។



វិធីដែលវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ឆ្លង

វីរុសដែលបង្កវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ វារស់នៅក្នុងទឹកអង្គធាតុជាក់លាក់នៃរាងកាយរបស់មនុស្សដែលផ្ទុកវីរុស ហ៊ីវ ដូចជាឈាម, ទឹកកាមរបស់បុរស, និងជាតិសើមក្នុងរន្ធយោនីរបស់ស្ត្រី ។ វីរុសគឺឆ្លងនៅពេលទឹកអង្គធាតុទាំង នេះជ្រៀតចូលក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀត ។ វីរុសហ៊ីវអាចបានឆ្លងដោយ :-

- រួមភេទដោយមិនប្រើកុងដុម
- ប្រើម្ជុល ឬ ឧបករណ៍ ដែលចោះ ឬ កាត់ ស្បែកដែលមិនបាន សំលាប់មេរោគ
- ឈាមមានផ្ទុកវីរុស ដែលបានហូរចូលស្តាម រឬស ឬ ដំបៅបើកមុខ នៃមនុស្សម្នាក់ទៀត។
- ម្តាយដែលផ្ទុកវីរុស ចម្លងទៅកូនតាមរយៈ ការមានផ្ទៃពោះ, ពេលសម្រាលកូន ឬ ពេលបំបៅដោះកូន។



នៅតាមកន្លែងដែលគ្មានការធ្វើតេស្តឈាមសំរាប់វីរុសហ៊ីវ មនុស្សម្នាក់អាចឆ្លងវីរុសហ៊ីវពីការ បញ្ចូលឈាម ។ សំរាប់ព័ត៌មានអំពីការទប់ស្កាត់វីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ ចូរអានទំព័រ 179 ដល់ 182 ។

របៀបដែលទីវិសហ៊ីត / អេដស៍មិនឆ្លង

វិរុសហ៊ីតមិនអាចរស់នៅខាងក្រៅរាងកាយមនុស្សច្រើនជាងពីរ-បីនាទីឡើយ ។ វាមិនអាចរស់ដោយខ្លួនវានៅក្នុងខ្យល់ ឬ ក្នុងទឹកឡើយ ។

- ការប៉ះពាល់, ការឱប, ឬ ការចើប ។
- ការប្រើកំណាត់, សំភារៈដំណេក (កំរាល, ពូក, មុង, ភួយ, ខ្នើយ) ឬ បង្កន់រួមគ្នា ។
- ការប្រើកំណាត់, សំភារៈដំណេក (កំរាល, ពូក, មុង, ភួយ, ខ្នើយ) ឬ បង្កន់រួមគ្នា ។
- ការដេកក្រែមួយរួមគ្នា ។
- សត្វល្អិតទិច ឬ ខាំ ។



វិរុសហ៊ីត/អេដស៍មិនឆ្លងតាមការប៉ះពាល់គ្នាឡើយ។

របៀបដែលទីវិសហ៊ីត / អេដស៍មានឥទ្ធិពលលើស្ត្រី

ស្ត្រីដែលផ្ទុកវិរុសហ៊ីត ជាញឹកញយក្នុងខ្លួននាពេលជាមួយជីវិតអេដស៍លឿនជាងបុរស ។ ការខ្វះខាតចំណីអាហារត្រឹមត្រូវ និងការមានកូនអាចធ្វើឱ្យរាងកាយស្ត្រីមានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ ។ ស្ត្រីក៏ងាយឆ្លងវិរុសហ៊ីតជាងបុរសផងដែរ ។ ពេលទឹកកាមរបស់បុរសចូលក្នុងរាងកាយរបស់ស្ត្រីនៅអំឡុងពេលរួមរ័ក្ស វាអាចឆ្លងបានយ៉ាងងាយតាមរយៈរន្ធយោនី ឬ កស្ទួនចូលទៅក្នុងឈាមរបស់នាង ជាពិសេសបើស្បែកមានដាច់រលាត់ ឬ ដំបៅ ។ ករណីនេះអាចកើតឡើង ទោះបីជានាងមាន ឬ គ្មានពិការភាពក៏ដោយ ។

គំនិតដែលបង្កហានិភ័យអំពីទីវិសហ៊ីត/អេដស៍ និងស្ត្រីពិការ

គំនិតដ៏ខុសទំនងនិងបង្កទុក្ខទោសខ្លាំងបំផុតអំពីវិរុសហ៊ីត/អេដស៍គឺមានជំនឿថា បើបុគ្គលដែលផ្ទុកវិរុសហ៊ីត/អេដស៍បានរួមរ័ក្សជាមួយមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលនៅក្រមុំព្រហ្មចារិយ៍ នោះបុគ្គលដែលផ្ទុកវិរុសហ៊ីត/អេដស៍នឹងបានដាច់ពីជំងឺនេះ ។ ដោយសារតែគំនិតដ៏ចង្រៃនេះ បុរសដែលផ្ទុកវិរុសហ៊ីត/អេដស៍អាចទៅរកស្ត្រីពិការ បើបុរសនោះគិតថា ពីព្រោះតែនាងជាស្ត្រីពិការ នាងពិតជានៅក្រមុំព្រហ្មចារិយ៍ ហើយអាចធ្វើឱ្យគាត់ដាច់ពីជំងឺនេះ ។ រឿងនេះមិនពិតឡើយ ។ ការរួមរ័ក្សជាមួយស្ត្រីក្រមុំព្រហ្មចារិយ៍ គឺបានត្រឹមតែចម្លងវិរុសហ៊ីត/អេដស៍ដល់ស្ត្រីក្រមុំព្រហ្មចារិយ៍ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ ។ វាមិនបានធ្វើឱ្យបុគ្គលដែលផ្ទុកវិរុសហ៊ីត/អេដស៍មានសុខភាពមាំមួនដូចដើមវិញឡើយ ។

មួយរយៈកាលកន្លងទៅ ខ្ញុំបានជួបបុរសដែលនិយាយថា បើគាត់បានដេកជាមួយស្ត្រីម្នាក់ក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ គឺពិតជារួបខ្ញុំនេះឯង។ ពេលសួរគាត់ថាហេតុអ្វី? គាត់និយាយតាមគ្រង់ថា គាត់ដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងមានផ្ទៃពោះ ហើយគាត់ចង់បានគាត់នឹងដាច់ពីវិរុសហ៊ីត! មនុស្សប្រុសឆ្គុត!



ការដឹកខ្សែច្បាស់បើអ្នកមានផ្ទៃពោះស្ទើរតែស្ងៀម

ការធ្វើតេស្តពិនិត្យវីរុសហ៊ីវ

ពេលវីរុសហ៊ីវប្រៀបធៀបក្នុងរាងកាយមនុស្ស ប្រព័ន្ធការពាររោគក្នុងខ្លួនមនុស្សចាប់ផ្តើមផលិតអង់ទីភ័ក្ត្រដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុស ។ នៅរវាងពី 2 ទៅ 4 អាទិត្យ ការធ្វើតេស្តវីរុសហ៊ីវអាចរកឃើញអង់ទីភ័ក្ត្រទាំងនេះនៅក្នុងឈាម ។ នេះជាវិធីតែម្យ៉ាងគត់ដែលបុគ្គលម្នាក់អាចដឹងច្បាស់ថា ខ្លួនឯងបានឆ្លងវីរុសហ៊ីវ ។


លទ្ធផលវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តវីរុសហ៊ីវ មានន័យថា អ្នកបានឆ្លងវីរុស ហើយរាងកាយរបស់អ្នកបានផលិតអង់ទីភ័ក្ត្រចំពោះវីរុសហ៊ីវ ។ ថ្វីបើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងខ្លួនក៏ដោយ អ្នកអាចចម្លងវីរុសនេះដល់មនុស្សដទៃទៀត ។

លទ្ធផលអវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តវីរុសហ៊ីវ មានន័យ 1 ក្នុងចំណោម 2 យ៉ាង :-

- អ្នកមិនបានឆ្លងវីរុសហ៊ីវ ឬ
- អ្នកទើបតែឆ្លង ប៉ុន្តែរាងកាយអ្នកមិនទាន់ផលិតអង់ទីភ័ក្ត្រគ្រប់គ្រាន់ចំពោះវីរុសហ៊ីវដើម្បីរកវាយឃើញក្នុងពេលធ្វើតេស្ត ។

បើអ្នកបានទៅធ្វើតេស្តវីរុសហ៊ីវ ហើយលទ្ធផលបង្ហាញការអវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែអ្នកគិតថាខ្លួនឯងបានឆ្លងវីរុស អ្នកគួរតែធ្វើតេស្តម្តងទៀតក្នុងរវាង 6 អាទិត្យក្រោយមក ។ ជួនកាលលទ្ធផលធ្វើតេស្តវីរុសហ៊ីវវិជ្ជមាន ក៏ត្រូវការទៅធ្វើតេស្តឡើងវិញម្តងទៀតដែរ ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលមានបទពិសោធន៍អាចជួយអ្នកឱ្យសំរេចចិត្ត ។

ចំណាំ : ការធ្វើតេស្តនិងការពិគ្រោះបញ្ហាសំរាប់វីរុសហ៊ីវ តាមធម្មតាបានធ្វើឡើងក្នុងពេលតែមួយ ហើយសេវារបំរើបែបនេះបានបង្កើតច្រើនឡើងៗដើម្បីបំរើតម្រូវការបុគ្គលមានបញ្ហានេះ ។ ចូរសាកសួរបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកតើកន្លែងណាដែលអ្នកអាចទៅធ្វើតេស្តបាន ។ នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើន ការធ្វើតេស្តវីរុសហ៊ីវ គឺមានបំរើយ៉ាងរហ័សក្នុងតម្លៃទាប ឬមិនបង់ថវិកាអ្វីទាំងអស់ ។



តាមធម្មតាអ្នកអាចទទួលលទ្ធផលតេស្តក្នុងថ្ងៃដដែលនោះ ។ មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តមួយចំនួនមានព័ត៌មានជាភាសាប្រែយ័ និងខ្លះទៀតមានជាភាសាសញ្ញា ។


សំខាន់ : អ្នកអាចចម្លងវីរុសហ៊ីវទៅឱ្យមនុស្សដទៃទៀតបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស គឺក្នុងពេលអ្នកបានឆ្លងវាភ្លាមៗ ថ្វីបើអ្នកមើលទៅមានសុខភាពមាំមួននិងមានអារម្មណ៍ល្អក៏ដោយ ។ អ្នកមិនអាចស្មានពីការសម្លឹងមើលមនុស្សតែសំបកក្រៅ ថាតើបុរស ឬ ស្ត្រីនោះមាន ឬ គ្មានវីរុសហ៊ីវឡើយ ។ វិធីដែលអាចដឹងឱ្យច្បាស់ថា អ្នកបានឆ្លងមានតែម្យ៉ាងគត់ គឺទៅធ្វើតេស្តវីរុសហ៊ីវ ។

ទរទរពិគ្រោះបញ្ហា

ការធ្វើតេស្តវិរុសហ៊ីវគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើង :-

- ដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក ។
- ដោយមានការពិគ្រោះបញ្ហាមុនពេល និង ក្រោយពេលធ្វើតេស្ត ។
- ដោយគោរពរក្សាការសំងាត់ដែលជាភាពឯកជនរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ ហើយមានតែរូបអ្នកផ្ទាល់និងបុគ្គលណាដែលអ្នកចង់ប្រាប់ឱ្យដឹងអំពីលទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះ ។

អ្នកពិគ្រោះបញ្ហាដែលមានជំនាញខាងវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ អាចជួយអ្នកឱ្យសំរេចចិត្តកាលណាអ្នកត្រូវការទៅធ្វើតេស្តសំរាប់វិរុសហ៊ីវ ។ បើលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកបានបង្ហាញភាពវិជ្ជមាន អ្នកពិគ្រោះបញ្ហាអាចជួយអ្នកឱ្យសំរេចចិត្តថា នរណាខ្លះដែលអ្នកត្រូវតែប្រាប់ ហើយវិធីណាខ្លះដែលជួយអ្នកឱ្យចេះតទល់ជាមួយការផ្លាស់ប្តូរនេះក្នុងជីវិតរបស់អ្នក ។



ការពិគ្រោះបញ្ហាសំរាប់បុគ្គលផ្ទុកវិរុសហ៊ីវនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ អាចមានន័យចំពោះភាពខុសគ្នារវាងក្តីសង្ឃឹម និងអស់សង្ឃឹម ។ ដូចស្ត្រីម្នាក់ដែលផ្ទុកវិរុសហ៊ីវនៅប្រទេសកេនយ៉ា បាននិយាយថា “ពេលអ្នកបានជួបនឹងអ្នកពិគ្រោះបញ្ហាល្អម្នាក់ អ្នកមានអារម្មណ៍ដូចខ្លួនឯងបានជាសះស្បើយអញ្ចឹង ។”

ការការពាររឿងសំខាន់ៗដល់ខ្លួនដែលជាភាពងក្រងរបស់អ្នក

ស្ត្រីណាក៏ដោយគួរតែអាចធ្វើការសំរេចចិត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ថាតើនាងត្រូវប្រាប់នរណាខ្លះឱ្យដឹងអំពីរឿងនាងផ្ទុកវិរុសហ៊ីវ និងវិធីដែលត្រូវប្រាប់ពួកគេ ។ វាជាការសំខាន់សំរាប់ស្ត្រីដើម្បីនិយាយជាមួយដៃគូដែលនាងបានរួមរក្សាជាមួយ ឬ ដៃគូ/ប្តី ធ្វើដូច្នោះ ពួកគេអាចទៅធ្វើតេស្ត ឬ ការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនផងដែរ ។ ស្ត្រីជាច្រើននាក់បាននិយាយប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន និងមនុស្សដែល គាំទ្រពួកគេ ។ ប៉ុន្តែជារឿយៗ ស្ត្រីខ្លាចមនុស្សទាំងឡាយក្នុងសហគមន៍ដឹងរឿងរបស់នាង ។

វាអាចជាការពិបាកចំពោះស្ត្រីពិការដើម្បីទទួលបានការសន្ទនាស្ងាត់ៗជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ ។ នេះប្រហែលជា ដោយសារ :-

- បុគ្គលិកសុខាភិបាលមិនធ្លាប់បានរៀនសូត្រថា ស្ត្រីពិការម្នាក់គួរត្រូវបានគោរពប្រតិបត្តិដូចស្ត្រីផ្សេងទៀតដែរ ។
- បុគ្គលិកសុខាភិបាលនឹងប្រាប់ក្រុមគ្រួសារ ឬ មិត្តភក្តិរបស់ស្ត្រីពិការជំនួសសាមីខ្លួនអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីពិការ រួមទាំងវិរុសហ៊ីវ ឬ ជំងឺកាមរោគណាមួយដោយមិនប្រាប់ស្ត្រីពិការផ្ទាល់ឱ្យដឹង ។ ករណីនេះជាការពិត ជាពិសេសកាលបើ ស្ត្រីពិការពិបាកប្រាស្រ័យទាក់ទង ។
- ក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ត្រីមិនព្រមឱ្យនាងជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាលតែម្នាក់ឯងឡើយ ។

ដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សថ្លង់ ជារឿយៗ ខ្ញុំមានបញ្ហានឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួន ជាពិសេស ពេលខ្ញុំប្រើអ្នកបកប្រែដើម្បីនិយាយនឹង បុគ្គលិកសុខាភិបាល។ អ្នកបកប្រែដែលធ្វើ ការនៅគ្លីនិកបានដឹងទាំងអស់អំពីអ្វីៗដែល បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងខ្ញុំនិយាយគ្នាអំពី ការសំងាត់ដែលរឿងផ្ទាល់ខ្លួន។ នាងមិន ដែលប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតឡើយ សូម្បីតែ បុគ្គលិកសុខាភិបាលឯទៀត អំពីអ្វីៗដែល យើងបាននិយាយ។



បើខ្ញុំយកអ្នកបកប្រែផ្ទាល់ខ្លួនទៅជាមួយ ខ្ញុំរំលឹកនាងជាមុនថាអ្វីៗដែលខ្ញុំនិយាយ ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល គឺជារឿងផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឱ្យ អ្នកបកប្រែបានយល់ថា លទ្ធផលពីការធ្វើ តេស្តគឺជារឿងសំងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំ។ ខ្ញុំស្នើឱ្យ នាងមិនឱ្យប្រាប់មនុស្សផ្សេងដោយគ្មាន ការយល់ព្រមពីខ្ញុំ ទោះបីជាក្រុមគ្រួសារ របស់ខ្ញុំក៏ដោយ។

ទេវរតន្តរៈជួយសំរាប់បណ្តាសុខភាពដែលបានបង្កដោយវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍

បុគ្គលម្នាក់ដែលផ្ទុកវិរុសហ៊ីវអាចមានជំងឺដោយងាយពីបញ្ហាសុខភាពទូទៅផ្សេងៗ ។ នេះជាព័ត៌មានទូទៅខ្លះៗអំពីបញ្ហាមួយ ចំនួន ប៉ុន្តែជាការល្អបំផុតក្នុងការនិយាយជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬ អានសៀវភៅដូចជា **សៀវភៅស្តីពីវិរុសហ៊ីវ**, និង **សៀវភៅស្តី ពីសុខភាពនិងសហគមន៍របស់អ្នក** សំរាប់ជួយជាព័ត៌មានបន្ថែម ។ ភាគច្រើនបំផុតបញ្ហាសុខភាពទូទៅបានបង្កពីវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ គឺ :-

ជំងឺគ្រុនក្តៅ - ជារឿយៗគ្រុនក្តៅតែងឈឺសារចុះសារឡើង ។ វាពិបាកដឹងណាស់ថា ជំងឺគ្រុនក្តៅនោះបង្កពីជំងឺឆ្លងដែលអាចព្យាបាល បាន ដូចជាជំងឺរបេង, ជំងឺរលាកក្នុងស្បូន, ឬ ជំងឺគ្រុនចាញ់ ឬ វាបង្កពីវិរុសហ៊ីវនោះផ្ទាល់ ។ បើជំងឺគ្រុនក្តៅបានបង្កពីជំងឺឆ្លងមួយ បន្ទាប់មកជំងឺឆ្លងនោះត្រូវតែបានព្យាបាលឱ្យពិតប្រាកដ ។

ជំងឺរាគស្វ័យ : ជំងឺរាគស្វ័យអាចរីសារចុះសារឡើង ហើយពិបាកព្យាបាល ។ មូលហេតុទូទៅដែលបណ្តាលឱ្យរាគស្វ័យចំពោះអ្នកជំងឺអេដស៍ គឺជំងឺឆ្លងដោយសារវីរុសហ៊ីវ ឬ ឥទ្ធិពលបង្កពីថ្នាំពេទ្យមួយចំនួន ។

កន្ទួលនិងរមាស់ស្បែក : ជារឿយៗ វាជាការពិបាកដឹងណាស់ថាអ្វីទៅដែលបានបង្កឱ្យស្បែកកន្ទួលនិងរមាស់ ។ បញ្ហាជំងឺស្បែកមួយចំនួនបានពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍អាចបានបង្កដោយ :-

- ការប្រតិកម្មចំពោះថ្នាំពេទ្យ
- វាធ្វើឱ្យសាច់ដុះឡើងក្រមរពណិកាហ្វេ ឬ ស្វាយ កើតលើមាត់ ឬ ស្បែកដែលបង្កពីមហារីកនៃសរសៃឈាម/ថ្នាំងជាលិកាហៅថា **កាប៉ូស៊ីនៃសារកូម៉ា (Kaposi's sarcoma)** ។
- វិរមជ័រិ (herpes zoster/shingles) ដែលជាធម្មតាចាប់ផ្តើមជាមួយពងទឹកថ្លា, ឈឺខ្នង ហើយបែកចំហមុខ ។ ធម្មតាវាកើតលើមុខ, ខ្នង, និងដើមទ្រូង ។



ចង្កោរនិងក្អក : ករណីនេះអាចបង្កមកពីជំងឺឆ្លង, ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួន, បញ្ហាពោះនិងពោះវៀន ឬ វីរុសហ៊ីវខ្លួនវាផ្ទាល់ ។



ក្អក : ករណីនេះអាចជាភោគសញ្ញានៃបញ្ហាសួត, ដូចជាជំងឺរលាកសួត ឬ រលាង ។ កាលណាសួតបានរលាក ឬ ឆ្លងជំងឺ សួតផលិតជាតិវិអិលដូចសំប៉ៅកាន់តែច្រើនថែមទៀតដែលវាបណ្តាលឱ្យអ្នកជំងឺក្អក ។

រលាង គឺជាជំងឺឆ្លងកាចសាហាវបានបង្កដោយមេរោគដែលធម្មតាប៉ះពាល់ដល់សួត ។ ភោគសញ្ញាជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាងគឺស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែជំងឺទាំងពីរនេះគឺខុសប្លែកពីគ្នា ។ ស្ត្រី, បុរស, និងកុមារស្ទើរតែទាំងអស់ដែលកើតជំងឺរលាង គឺមិនបានកើតជំងឺអេដស៍ឡើយ ។ ប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ដែលកើតជំងឺអេដស៍អាចកើតជំងឺរលាងយ៉ាងងាយ ដោយសាររាងកាយរបស់គាត់ចុះខ្សោយនិងការប្រឆាំងវា ។ មនុស្សមួយនាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស 3នាក់ដែលកើតជំងឺអេដស៍ គឺជំងឺរលាងទៅវិញទៅមកដែលបានសំលាប់ពួកគេ ។

បញ្ហាមាត់និងបំពង់ក : បញ្ហាអាចរួមបញ្ចូលទាំង :- រលាកខ្លាំង, ប្រេះ, ដំបៅ, ពងបែក, ហើយអណ្តាតកើតជ្រាំងពណ៌ស (ជ្រាំងអណ្តាត ចូរអានទំព័រ 260) ។

ចុះទំងន់និងទទួលម្ហូបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ : អ្នកកើតអេដស៍អាចទៅជាខ្លះជាតិម្ហូបអាហារក្នុងខ្លួន ដោយសារគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយពីជំងឺរាគស្វ័យ ដែលរារាំងរាងកាយពីការស្រូបយកជាតិចំណីអាហារដើម្បីទ្រទ្រង់រាងកាយឱ្យធំធាត់, ពីការបាត់បង់ការឃ្នានចំណីអាហារ, និងពីបញ្ហាកើតជំងឺមាត់ដែលធ្វើឱ្យគាត់ពិបាកហូបចុក ។ ការចុះទំងន់គឺជារឿងធម្មតាចំពោះអ្នកផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ ដែលនៅតំបន់មួយចំនួននៃទ្វីបអាហ្វ្រិក, ជំងឺអេដស៍ត្រូវបានគេហៅថា "ជំងឺស្លឹម" ។

ការព្យាបាលសំរាប់អ្នកជំងឺ/អេដស៍

នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាំពេទ្យ ឬ ថ្នាំបុរាណ មិនទាន់បានរកឃើញអ្វីមួយដែលអាចព្យាបាលរោគអេដស៍ឱ្យជាដាច់ស្រឡះឡើយ ។ ប៉ុន្តែមានវិធីជាច្រើនយ៉ាងដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយបុគ្គលកើតជំងឺអេដស៍ ។ ទឹកស្អាត, ម្ហូបអាហារមានជីវជាតិ, សំលៀកបំពាក់បោកកកស្អាតបាត, កន្លែងដេកសម្រាកមានអនាម័យស្អាតបាត, និងបង្កបង្កើតទំនាក់ទំនងកក់ក្តៅដោយក្តីស្រឡាញ់ជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ ដែលអាចជួយឱ្យអ្នកជំងឺអេដស៍រក្សាសុខភាពបានមាំមួន ។ ម្ហូបអាហារទាំងឡាយណាដែលល្អសំរាប់បុគ្គលដែលមានសុខភាពមាំមួន ម្ហូបអាហារទាំងនោះក៏ល្អសំរាប់អ្នកមានជំងឺដែរ (ចូរអានពីទំព័រ 177 ដល់ 178) ។



ថ្នាំប្រើគ្មានអ្វីព្យាបាលជំងឺអេដស៍ឱ្យជាដាច់ក៏ដោយ ថ្នាំពេទ្យ**អង់ទីរេត្រូវីវ៉ាល់ (អេ-អរ-វី)**[antiretroviral (ARVs)] ឥឡូវនេះត្រូវបានប្រើយ៉ាងជោគជ័យដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពអ្នកជំងឺអេដស៍ ។ **អេ-អរ-វី** ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខភាពក្នុងរាងកាយអ្នកជំងឺដូច្នេះអ្នកជំងឺអេដស៍អាចទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ ហើយរក្សាបានសុខភាពមាំមួន ។ ប៉ុន្តែវីរុសហ៊ីវ/មិនជាដាច់ឡើយ ។ វីរុសមួយចំនួនតូចនៅតែស្ថិតក្នុងរាងកាយអ្នកជំងឺជានិច្ច ។ កាលណាបុគ្គលម្នាក់កើតជំងឺអេដស៍ បុរស ឬ ស្ត្រីអាចចម្លងវីរុសនៅឱ្យអ្នកផ្សេងទៀតជានិច្ច ។

ការទទួលបានការគាំពារសុខភាពល្អ ជារឿយៗមិនងាយស្រួលឡើយសំរាប់ស្ត្រីពិការ និងចំពោះបុគ្គលផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ វាកាន់តែពិបាកខ្លាំងថែមទៀត ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចមិនចង់ធ្វើតេស្ត ឬ ពិនិត្យសុខភាពឱ្យពួកគេ ពីព្រោះបុគ្គលិកសុខាភិបាលគិតថា ស្ត្រីពិការមិនអាចមានការរួមភេទ, មិនអាចឆ្លងជំងឺវីរុស/អេដស៍, ឬ នឹងស្លាប់ភ្លាមកាលណាពួកគេបានឆ្លងជំងឺ ។

ស្ត្រីពិការមានបញ្ហារងគ្រោះចំពោះការឆ្លងវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ដូចស្ត្រីឯទៀតអញ្ចឹងដែរ ប៉ុន្តែពួកគេក៏អាចរស់នៅបានយឺតយូរ និងមានសុខភាពមាំមួន កាលបើពួកគេទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ ។

ការព្យាបាលតាមវិធីថ្នាំពន្យារពេល អង់ទីរេត្រូវីវ៉ាល់ តេរ៉ាពី (អាត) [AntiRetroviral Therapy (ART)]

ការព្យាបាលតាមវិធីថ្នាំពន្យារពេល**អង់ទីរេត្រូវីវ៉ាល់ តេរ៉ាពី (អាត)**ART) មានន័យថា ថ្នាំ**អង់ទីរេត្រូវីវ៉ាល់**ចំនួន 3 មុខបានផ្សំចូលគ្នាដើម្បីឱ្យអ្នកជំងឺលេបយ៉ាងតិចណាស់ក៏ត្រូវលេប 2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ កាលណាបុគ្គលម្នាក់ចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំ**អាត** បុគ្គលនេះត្រូវតែលេបថ្នាំយ៉ាងហ្មត់ចត់ឱ្យចំហើងទៀងទាត់រាល់ៗថ្ងៃ ។ ស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងប្រើថ្នាំ**អាត**នឹងឡើងទំងន់ ហើយដឹងថាខ្លួនឯងមានសុខភាពមាំមួនជាងមុន ។ ប៉ុន្តែបើគាត់ឈប់ប្រើថ្នាំ**អាត** ឬ ខកខានមិនបានផឹកថ្នាំតាមកំណត់ដូសរបស់វា ឬ ផឹកវាមិនចំហើងដូចសព្វដង, វីរុសក្នុងខ្លួនគាត់នឹងសើរើយ៉ាងខ្លាំងក្លាឡើងវិញ ហើយធ្វើឱ្យគាត់ឈឺចុះខ្សោយម្តងទៀត ។ ចំពោះព័ត៌មានអំពីថ្នាំសំរាប់ព្យាបាលវីរុស/អេដស៍សំរាប់ស្ត្រីពិការ ឬ សំរាប់ការពារកុំឱ្យវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍រាលដាលពីម្តាយទៅទារក, ចូរអានពីទំព័រ 358 ដល់ 362 ។

ថ្នាំ**អាត**ថ្លៃក៏ដោយ តំលៃថ្នាំនេះកំពុងតែចុះថោកឡើងៗ និងងាយរកបាន ឬ មានលក់ច្រើនឡើងៗនៅតាមប្រទេសជាច្រើន ។ នៅតាមសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាល និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតអាចផ្តល់ថ្នាំ**អាត**ក្នុងតំលៃទាប ឬ ផ្តល់ឱ្យមិនបង់ប្រាក់អ្វីឡើយ ។

ថ្នាំប្រើយ៉ាងនេះក្តី នៅតាមបណ្តាសហគមន៍ជាច្រើន ថ្នាំនេះមិនមានសំរាប់ផ្តល់ឱ្យអ្នកជំងឺវីរុស/អេដស៍ស្ទើរតែទាំងអស់ ។ សិទ្ធិអំណាចនៃក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថធំៗនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានៗ ជារឿយៗបានរារាំងបញ្ឈប់មិនឱ្យប្រទេសដទៃទៀតផលិតថ្នាំក្នុងប្រទេសខ្លួនផ្ទាល់ដែលមានតំលៃថោកសមរម្យ ។ ករណីនេះបដិសេធស្ត្រីរាប់លាននាក់ ចំពោះច្រកទៅរកថ្នាំដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីព្យាបាលវីរុស/អេដស៍ ។

ការទប់ស្កាត់ជំងឺមួយចំនួនជាមួយថ្នាំពេទ្យ

ចំពោះអ្នកផ្ទុកវីរុស/អេដស៍ ការប្រើថ្នាំផ្សះកូត្រីម៉ុកសាហុល (cotrimoxazole) ឡើងទាត់ជួយទប់ស្កាត់ រោគរលាកសួត, ជំងឺរាករូស, និងជំងឺមួយចំនួនទៀត ។ អ្នកគួរចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំផ្សះនេះ បើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយការចុះ ទំងន់, ដំបៅ, ពងបែក, ឬ ប្រេះជុំវិញមាត់, កន្ទួលរមាស់, រើមដីរី, ពងបែកក្នុងមាត់, ឬ ផ្តាសាយញឹកញាប់ពេក ។

ការព្យាបាល : ចូរប្រើថ្នាំផ្សះកូត្រីម៉ុកសាហុល (cotrimoxazole), (ថាមពលថ្នាំមានកំរិតខ្លាំងទ្វេដង) ចំណុះ 960 មីលីក្រាម (mg), លេបវារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយទឹកឱ្យច្រើន ។ បើអាចធ្វើបាន ចូរផឹកថ្នាំនេះរៀងរាល់ថ្ងៃ ទោះបីជាអ្នកឈឺ ឬ មិនឈឺក៏ដោយ ។


សំខាន់ : ការប្រតិកម្មពីថ្នាំនេះ គឺកើតមានតាមធម្មតាចំពោះអ្នកជំងឺអេដស៍ ។ ចូរឈប់ផឹកថ្នាំនេះបើអ្នក ឡើងកន្ទួលៗលើស្បែកជាថ្មីទៀត ឬ រោគសញ្ញាផ្សេងទៀតនៃការប្រតិកម្មថ្នាំ ឬ រើអស្ស្រងថ្នាំ ។

សំខាន់ : ស្ត្រីខ្លះមានបញ្ហាច្រើនជាមួយរោគផ្សិតយីសនៃយោនី ក្នុងពេលពួកគេផឹកថ្នាំផ្សះទាំងឡាយ ។ ការហូបយ៉ាំអ្នរ/ទឹកដោះគោះជូរ ឬ អង្កុយត្រាំទឹកលាយយ៉ាំអ្នរ ឬ លាយទឹកខ្លះអាចជួយឱ្យបានច្រើន ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីរោគផ្សិតយីស ចូរអានទំព័រ 111 ដល់ 113 ។ នៅតាមប្រទេសមួយចំនួនមានការផ្តល់ជា យោបល់ផងដែរ ដែលអ្នកជំងឺអេដស៍ត្រូវផឹកថ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺរបេង ។ ចូរទៅជួបជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែល មានជំនាញដើម្បីពិគ្រោះបញ្ហានេះ ។

ការហូបចុកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ជំងឺអេដស៍ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពត្រឹមត្រូវចំពោះការរំលាយអាហាររបស់រាងកាយ និងបង្កឱ្យអ្នកជំងឺមិនសូវហូបចំណីអាហារ ទង្វើនេះធ្វើឱ្យរាងកាយអ្នកជំងឺស្គមស្គាំងផងដែរ ។ ឥទ្ធិពលនៃថ្នាំពេទ្យក៏ជាបញ្ហាអាចកើតឡើងដែរ វាបង្កបញ្ហាមាត់ និងបំពង់ក, រាករូស, និងបង្កការលំបាករំលាយជាតិខ្លាញ់ ។

បើអ្នកផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ វាជារឿងពិសេសណាស់ដែលអ្នកត្រូវព្យាយាមហូបម្ហូប អាហារឱ្យបានល្អ ដូច្នេះអ្នកមិនចុះទំងន់ ហើយរាងកាយនិងប្រព័ន្ធការពាររោគក្នុងខ្លួន អ្នកអាចរក្សាបានសុខភាពមាំមួន ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះ ចូរព្យាយាមហូបម្ហូបអាហារ ច្រើនយ៉ាង ឬ ឱ្យសមល្មម (អានទំព័រ 86), ផឹកទឹកស្អាត/សុទ្ធ និងផឹកវីតាមីនចម្រុះ ឱ្យឡើងទាត់ប្រចាំថ្ងៃ ។ បើសិនជាអាចរកបាន, អ្នកក៏អាចផឹកវីតាមីន-អា, វីតាមីន-សេ, និងវីតាមីន-អ៊ុបន្ថែមផងដែរ, វីតាមីនទាំងនេះអាចបន្ថយសមត្ថភាពវីរុសហ៊ីវកុំឱ្យលូតលាស់ក្នុងរាងកាយអ្នក ។



ម្ហូបអាហារដែលមានវីតាមីន-អា រួមមាន :- ការ៉ុត, ស្វាយ, ល្ពុង, ដឡូងជ្វា, ទឹកដោះគោះ, ពងមាន់-ទា, បន្លែស្លឹកបៃតងៗ (ស្លឹកខាត់ណា, ស្លឹកផ្លិ, ស្លឹកស្ពៃ, ស្លឹកប្រុះ, ស្លឹកដឡូង, ស្លឹកម្លេស, សាឡាត់) ។ល ។

ម្ហូបអាហារដែលមានវីតាមីន-សេ រួមមាន :- ម្ទេសប្លោកក្រហមនិងបៃតង, បន្លែស្លឹកបៃតងចាស់ (ស្លឹកខាត់ណា, ស្លឹកផ្លិ, ស្លឹកដំឡូងជ្វា, ស្លឹមម្រុំ, ស្លឹកផ្លិ, ស្លឹកប្រុះ, សាឡាត់, និងស្លឹកស្ពៃ) និងក្រូចពោធិ៍សាត់, ផ្លែឈើដែលមានពណ៌លឿងនិងក្រហម ។

ម្ហូបអាហារដែលមានវីតាមីន-អ៊ី រួមមាន :- ពងមាន់-ទា, ប្រេងឆាវាញ់ពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិ (អាល់មីន, ពោត, សណ្តែកដី, ត្នោត, ឈូករត្នី និង អូលីវ) ។

បើអ្នកបាត់បង់ការឃ្លានចំណីអាហារ អ្នកប្រហែលជារកឃើញថា ការហូបម្ហូបអាហារឱ្យច្រើននៅពេលព្រឹកអាចមានប្រយោជន៍សំរាប់អ្នក ។ ឬ អ្នកប្រហែលជាចង់ហូបម្ហូបអាហារតិចៗពី 6 ទៅ 8 ដងក្នុងរយៈពេលថ្ងៃ ។ ចូរផឹកទឹកត្រជាក់ជាមួយម្ហូបអាហារ ទឹកជួយបង្កឱ្យអ្នកលេបអាហារបានងាយស្រួលច្រើន ។

ការរស់នៅប្រកបភាពវិជ្ជមានជាមួយវិរុស/អេដស៍

អ្នកនឹងកាន់តែមានសុខភាពមាំមួនឡើង បើអ្នកអាច :-

- ផឹកនិងរៀបចំម្ហូបអាហារជាមួយទឹកបរិសុទ្ធដែលមានសុវត្ថិភាពមួយមុខគត់ ។
- ចូរចៀសវាងហូបបន្លែឆៅ-រាងកាយអ្នកមានការលំបាករលាយបន្លែឆៅ និងវាអាចមានមេរោគ ។
- ចូរផឹកទឹកឱ្យបានច្រើន ហើយសំគាល់មើលការខ្សោះជាតិទឹកក្នុងខ្លួន ។
- ចូរសម្រាកកាលណាអ្នកមានអារម្មណ៍អស់កំលាំង ហើយដេកឱ្យបាន 8 ម៉ោងយ៉ាងតិច ។
- ចំណាយពេលសំណេះសំណាលជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ ។
- ចូរធ្វើអ្វីៗដែលអ្នករីករាយនឹងធ្វើ ។ ការមានអារម្មណ៍ល្អជាចំណែកនៃសុខុមាលភាពមាំមួន ។
- ចូរព្យាយាមកុំព្រួយចិត្តច្រើនពេក ។ ការតឹងតែងចិត្តអាចបង្កទុក្ខទោសដល់ប្រព័ន្ធការពាររោគក្នុងខ្លួនអ្នក ។
- ចូរធ្វើការប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ដើម្បីរក្សាខ្លួនអ្នកឱ្យជាប់រវល់យ៉ាងសកម្ម ។
- ចូរហាត់ប្រាណឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន (ចូរអានពិទ័ព័រ 89 ដល់ 95) ។
- ចូរចៀសវាងជក់បារី ឬ ប្រើថ្នាំជក់, ហាមផឹកគ្រឿងស្រវឹង និងគ្រឿងញៀនទាំងឡាយ ។
- ចូរទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងដោយការលាងសំអាតឱ្យបានញឹកញាប់ ។
- ចូរអនុវត្តសុវត្ថិភាពរួមរក្សដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងថ្មីៗ និងការមានផ្ទៃពោះមិនបានគ្រោងទុក ដែលវាអាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធការពាររោគក្នុងខ្លួនចុះខ្សោយ (ចូរអានទ័ព័រ 180) ។
- ចូរទៅរកការគាំពារផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រឱ្យទាន់ពេល ។ ជំងឺឆ្លងនីមួយៗអាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធការពាររោគក្នុងខ្លួនកាន់តែខ្សោយខ្លាំង ។
- ចូរលេបថ្នាំផ្សះកូទ្រីម៉ុកសាហ្សុល ដើម្បីការពារកុំឱ្យមានជំងឺរាគរូស (ចូរអានទ័ព័រ 339) ។
- ចូរដេកលើគ្រែនិងដាក់មុងឱ្យត្រឹមត្រូវ បើអ្នករស់នៅតំបន់ដែលតែងកើតមានជំងឺគ្រុនចាញ់ ។

ខ្ញុំកើតអេដស៍ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានលទ្ធភាពទទួលបានម្ហូបអាហារត្រឹមត្រូវ, ទឹកស្អាត, និងថ្នាំពេទ្យ។ សុខភាពខ្ញុំល្អ ហើយខ្ញុំអាចរក្សាការងាររៀបចំសំបុត្រនៅប្រៃសណីយ៍។



ចូរធ្វើការប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពដែលឈានទៅរកការរាលដាលនៃជំងឺ ហើយកុំប្រឆាំងនឹងមនុស្សដែលកើតជំងឺ។ ការរើសអើងគឺជាឧបសគ្គចំពោះការថែទាំ។ វាប្រហែលជាបញ្ឈប់មនុស្សពីការរៀនសូត្រវិធីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ។

ការរក្សាសុខភាពសុខភាពស្រស់ និង វិវិស្ស/អេដស៍

នៅតាមសហគមន៍មួយចំនួន មនុស្សដែលផ្ទុកវិវិស្សហ៊ីវ ឬ កើតជំងឺអេដស៍ត្រូវបានធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍អាក្រក់ ។ មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងសហគមន៍មិនរាប់រាកទាក់ទាញជាមួយពួកគេឡើយ ហើយមនុស្សម្នាក់ៗមានគំនិតផងដែរថា ក្រុមគ្រួសារនៃបុគ្គលដែលផ្ទុកវិវិស្សហ៊ីវ/អេដស៍ត្រូវបានធ្វើឱ្យអាប់អោនកិត្តិយសរបស់សហគមន៍ ។ មនុស្សផ្ទុកវិវិស្សហ៊ីវ ឬ កើតជំងឺអេដស៍រាប់ពាន់នាក់បានលាក់បាំងរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួន ។ ពួកគេភ័យខ្លាចមិត្តភក្តិ, ក្រុមគ្រួសារ, និងពួកគេជិតខាងលែងរាប់អាន ថ្វីបើវិវិស្សហ៊ីវ/អេដស៍មិនឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈការនិយាយស្តីដែលជាទំនាក់ទំនងធម្មតាក៏ដោយ ។

មនុស្សកើតអេដស៍ជាច្រើននាក់និងក្រុមគ្រួសារមិនស្នើសុំការជួយយកអាសារពីសហគមន៍របស់ខ្លួនឡើយ ដោយសារពួកគេមានអារម្មណ៍អាក្រក់ និងការមាក់ងាយពីសហគមន៍មកលើពួកគេ ។ រឿងនេះអាចធ្វើឱ្យពិបាកចំពោះទ្រង់ទ្រាយសំរាប់បុគ្គលកើតអេដស៍ក្នុងការទទួលបានការជួយនិងការព្យាបាលដែលគាត់ត្រូវការ ថ្វីបើមានថ្នាំពេទ្យដែលជួយពន្យារពេលឱ្យមនុស្សកើតអេដស៍រស់នៅបានយូរ និងមានសុខភាពមាំមួនឡើងវិញក៏ដោយ ។

ការរក្សាសុខភាពសុខភាពស្រស់នេះ


មនុស្សជាច្រើនតែងគិតថា វិវិស្សហ៊ីវឆ្លងយ៉ាងងាយស្រួល ។ រឿងនេះមិនពិតឡើយ ។ បើអ្នកធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះ នោះវាក្លានជ្រោះថ្នាក់នៃការរាលដាលវិវិស្សហ៊ីវ ឬ ឆ្លងជំងឺធ្វើមពីអ្នកផ្ទុកមេរោគដល់មនុស្សទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញគាត់ ឬ អ្នកក៏មិនឆ្លងវិវិស្សហ៊ីវ ឬ ជំងឺធ្វើមឡើយ :-

- ហាមប្រើវត្ថុរួមគ្នាដែលប៉ះពាល់នឹងឈាម ។ រួមទាំង ឡាម, មូល, ឧបករណ៍មុតទាំងឡាយដែលអាចកាត់ស្បែកដាច់ និងច្រាស់ដុសធ្មេញ ។ បើអ្នកត្រូវតែប្រើវត្ថុនោះរួមគ្នា ដាំទឹកស្ទោរវាចំនួន 20 នាទីជាមុនសិន ទើបយកវាទៅប្រើ ។
- ចូរបិតដំបៅទាំងអស់ជាមួយបង់បិតដំបៅ ឬ កំណាត់ស្អាត ។ បុគ្គលដែលមាន ឬ គ្មានវិវិស្សហ៊ីវ ឬ ជំងឺធ្វើមក៏គួរតែធ្វើបែបនេះដែរ ។
- បង់/ស្បែកដំបៅគ្រិចដែលមិនអាចបោកគក់បាន ត្រូវតែដុត ឬ កប់ចោល ។
- ចូរចៀសវាងប៉ះពាល់ទឹករងៃដោយដៃទទេ ។ ប្រើចំរៀកប្លាស្ទិក ឬ ក្រដាស, ស្រោមដៃពេទ្យ ឬ ស្លឹកឈើធំៗទ្រាប់ដៃពេលអ្នកចាប់កាន់វត្ថុគ្រិចដូចជា បង់/ស្បែកដំបៅ, កំណាត់, ឈាម, ឬ លាមក ។
- ចូរលាងដៃអ្នកជាមួយទឹកនិងសាប៊ូ ក្រោយពេលផ្លាស់ប្តូរកន្ទួល/កំរាលពូល, ភួយ, និងខោអាវប្រឡាក់ ។
- ចូររក្សាកន្ទួល/កំរាលពូល, ភួយ, និងខោអាវឱ្យស្អាតជានិច្ច ។ ដើម្បីបោកគក់កន្ទួល/កំរាលពូល, ភួយ, និងខោអាវប្រឡាក់ ចូរធ្វើដូចខាងក្រោម :-
 - ទុកដាក់វត្ថុរបស់អ្នកជំងឺ ដែលប្រឡាក់ដាច់ដោយឡែកពីវត្ថុប្រចាំផ្ទះទាំងឡាយ ។
 - ចូរកាន់ជាយវត្ថុទាំងនោះត្រង់កន្លែងដែលមិនគ្រិច ហើយជះទឹកលាងសំអាតកន្លែងដែលទឹករងៃនៃដំបៅដាមប្រឡាក់ ។
 - ចូរបោកគក់កន្ទួល/កំរាលពូល, ភួយ, និងខោអាវប្រឡាក់ក្នុងទឹកមានសាប៊ូច្រើន ហើយព្យួរហាលឱ្យស្ងួត-បើអាចចូរហាលក្រោមកំដៅថ្ងៃ ហើយអ៊ុតនិងបត់តាមធម្មតា ។
- ពេលបោកគក់កន្ទួល/កំរាលពូល, ភួយ, និងខោអាវប្រឡាក់ វាក៏ជាការមានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ទេក្នុងការពាក់ស្រោមដៃ ឬ ប្រើស្បោងប្លាស្ទិករុំដៃរបស់អ្នក ។



វិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសហ៊ីវ

- ចូរព្យាបាលជំងឺកាមរោគឱ្យទាន់ពេល ។ ការមានជំងឺកាមរោគមួយក្នុងខ្លួន វាអាចធ្វើឱ្យងាយផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ ឬ ជំងឺកាមរោគផ្សេងៗទៀត ។
- កុំចាក់ថ្នាំ ដរាបណាអ្នកដឹងច្បាស់ថាឧបករណ៍សំរាប់ចាក់ថ្នាំទាំងអស់បានសំលាប់មេរោគជាមុនសិន ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលដាច់ខាត កុំយកម្ជុល ឬ ស៊ីរ៉ាំងដែលប្រើហើយមកប្រើឡើងវិញដោយគ្មានការសំលាប់មេរោគជាមុន ។
- ហាមប្រើម្ជុល ឬ ស៊ីរ៉ាំងជាមួយបុគ្គលផ្សេងទៀត ដរាបណាវាបានសំលាប់មេរោគ ឬ ស្ទោរចំនួន 20 នាទីជាមុនសិន ។
- ធ្វើយ៉ាងណាយកឧបករណ៍ដែលប្រើសំរាប់វះកាត់ស្បែកចុងដង្កូវ, ចោះត្រចៀក, ចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ, និងការអនុវត្តកូនពេទ្យបុរាណដូចជាព្យាបាលសំលាកស្បែកទៅស្ទោរសំលាប់មេរោគចំនួន 20 នាទីជាមុនសិន ។
- ចូរកាន់កាប់អង្គធាតុរាងកាយដូចជា ឈាម, កំអូត, លាមក និងទឹកនោមដោយប្រយ័ត្នប្រយែង ។
- ឈាមទាំងអស់គួរត្រូវតែធ្វើតេស្តដើម្បីដឹងច្បាស់ថា វាគ្មានផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ ឬ ជំងឺឆ្លើម ។ ថ្វីបើវាបានធ្វើតេស្តហើយក៏ដោយ ចូរចៀសវាងការបញ្ចូលឈាម លើកលែងតែមានករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលកំពុងគំរាមគំហែងអាយុជីវិត ។



ការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព

ស្ទើរតែគ្រប់ពេលទាំងអស់ វីរុសហ៊ីវនិងជំងឺកាមរោគដទៃទៀត គឺបានឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតក្នុងពេលកំពុងរួមភេទ ។ អ្នកអាចការពារខ្លួនពីជំងឺកាមរោគជាមួយព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពរួមភេទ, គោរព, មានច្រករកបានស្រោមអនាម័យមកប្រើប្រាស់, ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងការនិយាយជាមួយដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នក ។

ប៉ុន្តែវាអាចជាការពិបាកសំរាប់ស្ត្រីគ្រប់រូប ចំពោះការការពារខ្លួនពីជំងឺឆ្លងតាមការរួមភេទ ពេលគាត់មិនបានគ្រោងទុក ឬ អនុញ្ញាតក្នុងការសំរេចចិត្តអំពីរឿងរួមភេទ ។ អ្នកប្រហែលជាខ្លាច ឬ ក៏ខ្មាសក្នុងការស្នើសុំឱ្យបុរសប្រើស្រោមអនាម័យ ឬ អ្នកត្រូវតែរួមភេទពេលដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកបញ្ជា ។ ហើយអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងថាតើដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកបានរួមភេទនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតដែរឬយ៉ាងណា ។ ស្ត្រីរាល់រូបត្រូវការដឹងពីរបៀបដែលគាត់អាចធ្វើដើម្បីឱ្យការរួមភេទមានសុវត្ថិភាព ។



ម៉ែះទៅដេកជាមួយយើង!

មិនដឹងជាគាត់ទៅកន្លែងណាខ្លះទេ?

វិធីរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព

ការអនុវត្តសុវត្ថិភាពរួមភេទមានន័យថាការប្រើរបាំងរាវាំង (ដូចជាស្រោមអនាម័យ) ដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគមិនឱ្យឆ្លងរវាងអ្នកនិងដៃគូ/ប្តី ឬ ការរួមភេទតាមវិធីដែលកាត់បន្ថយជំងឺមិនឱ្យឆ្លងដល់គ្នា។ ការរួមភេទជាមួយលិង្គនិងរន្ធយោនី (ការរួមសង្វាស) គឺជាវិធីកើតឡើងស្ទើរតែទូទៅដែលបុរសនិងស្ត្រីធ្វើការរួមភេទ។ ប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធអាចផ្តល់និងទទួលការរំភើបរីករាយនឹងការរួមភេទដោយការប្រើប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនតាមរយៈការនិយាយនិងការស្តាប់អង្វែល។ បើដៃគូ/ប្តីមិនចង់ប្រើស្រោមអនាម័យ អ្នកអាចព្យាយាមអនុវត្តវិធីរួមភេទតាមរបបផ្សេងៗដែលមានសុវត្ថិភាព។ ការអនុវត្តទាំងនេះអាចធ្វើឱ្យដៃគូ/ប្តីស្រឡាញ់-ហើយមានសុវត្ថិភាពច្រើនសំរាប់អ្នក។

មានសុវត្ថិភាពកាន់តែច្រើន


- ចៀសវាងការរួមភេទទាំងស្រុង។ បើអ្នកមិនរួមភេទ អ្នកនឹងមិនមានឆ្លងជំងឺកាមរោគឡើយ។ ស្ត្រីខ្លះអាចរកឃើញថាវិធីនេះគឺជាជំរើសល្អបំផុត ជាពិសេសពេលពួកគេនៅវ័យក្មេង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សំរាប់ស្ត្រីស្ទើរតែទាំងអស់ ជំរើសនេះ គឺមិនអាចធ្វើបាន ឬ មិនមែនជាក្តីប៉ងប្រាថ្នា។
- ការរួមភេទជាមួយបុគ្គលតែម្នាក់គត់ ដែលអ្នកដឹងច្បាស់ថាគាត់បានរួមភេទជាមួយអ្នកម្នាក់គត់ ហើយពេល (តាមរយៈការធ្វើតេស្ត) អ្នកដឹងច្បាស់ថា អ្នកទាំងពីរមិនបានឆ្លងជំងឺអ្វីមួយពីដៃគូមុនៗឡើយ។
- ការរួមភេទដោយការស្តាប់អង្វែលឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក និងការស្តាប់អង្វែលប្រដាប់ភេទអ្នកដោយប្រើដៃរបស់អ្នក (ការធ្វើឱ្យកើនសំរើបស្រឡាញ់ទាំងសងខាង)។
- ប្រើស្រោមអនាម័យនៅពេលកំពុងរួមភេទដោយប្រើមាត់។ របាំងនៃកោសិកា ឬ ប្លាស្ទិកជួយទប់ស្កាត់ជំងឺរីមនិងប្រមេមិនឱ្យកើតក្នុងបំពង់ក។ វាក៏ការពារប្រឆាំងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺឆ្លងជាមួយវិរុសហ៊ីវតាមរយៈការដាច់រលាត់តិចតួចក្នុងមាត់។




មានសុវត្ថិភាព

- ចូរប្រើស្រោមអនាម័យផលិតពីជ័រកោសិកាជាទីផ្ទះ-ទាំងបុរស ឬ ស្ត្រីក៏ដោយ-នៅពេលកំពុងរួមភេទជាមួយលិង្គនិងរន្ធយោនី ឬ លិង្គនិងរន្ធតូទ។
- ការរួមភេទតាមវិធីដែលចៀសវាងកុំឱ្យអង្គធាតុពីរាងកាយរបស់ដៃគូ/ប្តីចូលក្នុងរន្ធយោនី ឬ រន្ធតូទរបស់អ្នក។
- ការរួមភេទដោយប្រើមាត់របស់អ្នក គឺមិនសូវឆ្លងវិរុសហ៊ីវឡើយ។ បើអ្នកធ្វើឱ្យទឹកកាមចូលមាត់ ចូរស្តោះវាចេញ។

ប្រភេទរូមរ័ក្សមួយចំនួនរវាង
បុរសនិងស្ត្រី គឺមានសុវត្ថិភាពជាង
ប្រភេទរូមរ័ក្សមួយចំនួនទៀត។



ការចើបមានសុវត្ថិភាព



ការស្នាមដៃមានសុវត្ថិភាព



ការរូមរ័ក្សតាមមាត់ដោយ
មិនប្រើស្រោមអនាម័យ
គឺមិនសូវមានសុវត្ថិភាព ។



ការរូមរ័ក្សនឹងរន្ធយោនីគឺមានគ្រោះ
ថ្នាក់ច្រើន ប៉ុន្តែមានសុវត្ថិភាពច្រើន
ដោយប្រើស្រោមអនាម័យ។



ការរូមរ័ក្សនឹងរន្ធកូទគឺមានគ្រោះថ្នាក់
ច្រើន ប៉ុន្តែមានសុវត្ថិភាពច្រើន
ដោយប្រើស្រោមអនាម័យ។

វិនិច្ឆ័យទៀតៗដើម្បីកាត់បន្ថយសុវត្ថិភាពខាងមួយចំនួន

- ការឱ្យបុរសយកលិង្គចេញពីរន្ធយោនីមុនគាត់បញ្ចេញទឹកកាម ។ កាលណាទឹកកាមចូលក្នុងខ្លួនអ្នកតិច នោះអ្នកនឹងមានឱកាសតិចតួចក្នុងការឆ្លងវីរុសហ៊ីវពីបុរស ។
- ចូរចៀសវាងការរូមរ័ក្សដែលស្ងួត ។ កាលណារន្ធយោនី (ឬ រន្ធកូទ) ស្ងួត ស្បែកងាយដាច់រំហែកណាស់ ហើយករណីនេះបង្កើនឱកាសនៃជំងឺឆ្លង ។ ចូរប្រើទឹកមាត់ ឬ ក្រែមសំលាប់មេជីវិត ឬ ក្រែមខេ-វ៉ាយដើម្បីលាបរន្ធយោនីឱ្យរអិល ។ បើអ្នកប្រើស្រោមអនាម័យ ហាមប្រើប្រេង, ឡេលាបស្បែក, ឬ ក្រមួនប្រេងកាត (វ៉ាស៊ីលីន) អង្គធាតុទាំងនេះធ្វើឱ្យស្រោមអនាម័យរំហែក ។

ការរូមរ័ក្ស និង ឈាមរដូវ

នៅអំឡុងពេលអ្នកមានឈាមរដូវ ជារឿងល្អបំផុតកុំរូមរ័ក្សជាមួយរន្ធយោនី ដរាបណាអ្នកដឹងច្បាស់ថា អ្នកនិងដៃគូ/ប្តីគ្មានផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ ឬ ជំងឺកាមរោគផ្សេងៗ ។ បើអ្នកផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ, វីរុសនឹងបង្កប់ខ្លួនវាក្នុងកន្លែងសំងាត់នៃរន្ធយោនីនិងឈាមរបស់អ្នក ។ ករណីនេះនឹងបង្កើនឱកាសចម្លងវីរុសនេះដល់ដៃគូ/ប្តីអ្នក ។ បើដៃគូ/ប្តីអ្នកផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ ហើយអ្នកគ្មានវីរុសហ៊ីវ នោះអ្នកនឹងកើនឱកាសឆ្លងវីរុសហ៊ីវ បើអ្នករូមភេទក្នុងពេលអ្នកមានឈាមរដូវ ។ ការប្រើស្រោមអនាម័យនឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់បានច្រើន ។

ធ្វើការសំរាប់ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការ

ជំងឺកាមរោគ និងវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ គឺជាបញ្ហាសុខភាពសំរាប់សហគមន៍ទាំងមូល រួមទាំងស្ត្រីពិការផងដែរ ។ ជួនកាល ក្រុមពិការភាពគិតថា សុខភាពផ្លូវភេទមិនមែនជារឿងដែលពួកគេត្រូវព្រួយបារម្ភឡើយ ។ ប៉ុន្តែការអប់រំសុខភាពផ្លូវភេទអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបាន ។

ព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំសុខភាពផ្លូវភេទ និងអំពីវិធីទប់ស្កាត់ជំងឺកាមរោគត្រូវតែមានបំរើដល់មនុស្សគ្រប់រូប រួមទាំងស្ត្រីពិការផងដែរ ។ ឧទាហរណ៍អំពីព័ត៌មានលើការទប់ស្កាត់វីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ ជារឿយៗត្រូវបានផ្សាយតាមវិទ្យុ ឬ បោះពុម្ពជាសៀវភៅស្តើងៗ គួរតែមានចែកចាយ ហើយមានជាភាសាសញ្ញាសំរាប់មនុស្សច្រើន និងភាសាប្រែប្រួលសំរាប់ជនពិការភ្នែក ។

អ្វីៗដែលស្ត្រីពិការអាចធ្វើបាន

- ជួបជាមួយអ្នកថែទាំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ត្រីពិការដើម្បីរៀបរាប់ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់សំរាប់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានល្អៗអំពីសុខភាពផ្លូវភេទ ។
- ធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងក្រុមឯទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា សេវាបំរើផ្នែកវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ និងសុខភាពផ្លូវភេទបានទៅដល់ជនពិការទូទៅ ។
- បើសិនណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តិមកលើអ្នកតាមបែបកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងរឿងផ្លូវភេទ ចូរប្រាប់រឿងនេះដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្ត ដូចជាសមាជិកគ្រួសារ, ញាតិជិតខាង, ឬ បុគ្គលិកសុខាភិបាល ។



អ្វីៗដែលក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកថែទាំអាចធ្វើបាន

- ចូរធ្វើឱ្យប្រាកដថា ស្ត្រីពិការមានព័ត៌មានអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងវិធីទប់ស្កាត់វិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ ព្រមទាំងជំងឺកាមរោគ ។ ចូរផ្តល់ព័ត៌មានតាមរបៀបគោរពសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គល ។
- ចូរជួយយកអាសារឪពុកម្តាយនៃកុមារពិការឯទៀត ឱ្យគាត់បានយល់ថា កាលណាកូនដែលពិការធំពេញវ័យ កូននោះនឹងមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ ដូចកូនមិនពិការអញ្ចឹងដែរ ។



អ្វីៗដែលសហគមន៍អាចធ្វើបាន

វាគឺជារឿងសំខាន់សំរាប់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងសហគមន៍ដើម្បីយល់ដឹងពីវិធីដែលវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ និងជំងឺកាមរោគបានរាលដាល និងវិធីទប់ស្កាត់វា ។ ជាមួយព័ត៌មាននេះ មនុស្សម្នាក់ៗនឹងស្វែងយល់ថា ជំងឺឆ្លងទាំងនេះអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សទាំងឡាយដោយមិនរើសមុខ ហើយពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់វា ។ ហើយចំណេះដឹងទាំងនេះអាចជួយឱ្យមនុស្សយល់ដឹងបានច្បាស់ថា ស្ត្រីពិការមានតម្រូវការផ្នែកសេវាគាំពារសុខភាព ដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាទូទៅក្នុងសហគមន៍ដែរ ។

វាគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីតតាំងប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពដែលបណ្តាលឱ្យជំងឺរាតត្បាត ហើយកុំប្រឆាំងនឹងអ្នកជំងឺផ្ទាល់ ។ វិធីដែលអាចទប់ស្កាត់វិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ និងជំងឺកាមរោគបានល្អបំផុត គឺតាមរយៈការតស៊ូមិតដើម្បីធ្វើឱ្យការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្នែកសង្គម និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបានរីកចំរើនឡើង ធ្វើដូច្នោះស្ត្រីទូទៅ រួមទាំងស្ត្រីពិការផងដែរ មានឥទ្ធិពលច្រើនឡើងក្នុងការសំរេចចិត្តបែបនេះក្រុមគ្រួសារមិនចាំបាច់រស់នៅបែកគ្នាដើម្បីរកការងារធ្វើ ហើយមនុស្សមិនត្រូវការលក់ដូរខ្លួនប្រណាស់សំរាប់ការរួមរក្សាផងដែរ ។

- ចូរធ្វើឱ្យប្រាកដថាឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នា រួមទាំងស្ត្រីពិការផងដែរមានច្រកទៅរកព័ត៌មាន និងសេវាផ្នែកសុខភាពផ្លូវភេទ រួមមានស្រោមអនាម័យ, ទប់ស្កាត់វិរុសហ៊ីវ និងជំងឺកាមរោគផ្សេងទៀតមិនឱ្យឆ្លងដល់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងសហគមន៍ ។
- ចូរធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានថ្នាំពេទ្យ, ទឹកស្អាត, និងម្ហូបអាហារមានជីវជាតិសំរាប់មនុស្សដែលកំពុងរស់នៅជាមួយវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ ។
- ចូរធ្វើការអប់រំមនុស្សក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក ដើម្បីការពារក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការពីមនុស្សដែលកេងយកចំណេញខាងផ្លូវភេទ និងឱ្យជនឆ្លៀតឱកាសទាំងឡាយបានយល់ច្បាស់ថា ការរួមរក្សាជាមួយក្មេងស្រីពិការ/ស្ត្រីពិការ មិនធ្វើឱ្យជំងឺអេដស៍ជាសះស្បើយឡើយ ។

ខ្លួនចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ចូរដាក់បញ្ចូលស្ត្រីពិការក្នុងវគ្គសិក្សាស្តីពីការអប់រំសុខភាព ទាំងឡាយដែលអ្នកនឹងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល ហើយសង្កេតរកមើល ឱកាសដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយក្រុមស្ត្រីពិការដែលធ្លាប់បានធ្វើ ការប្រជុំរួចមកហើយ ។ ចូរគោរពសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីពិការ ។

ខាងនិយាយអំពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីជាមួយមនុស្សផ្សេងៗទៀត ទោះបីជាមនុស្សទាំងនោះជាក្រុមគ្រួសាររបស់នាងក៏ដោយ ដរាបណា ស្ត្រីដែលជាសាមីខ្លួនផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជាមុនសិន ។



- ចូរនិយាយពន្យល់ពីរបៀបដែលជំងឺកាមរោគ និងវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត និងវិធីដើម្បីការពាររោគឆ្លងទាំងនេះ ។ ចូរបង្ហាញរបៀបប្រើស្រោមអនាម័យសំរាប់បុរស និងរបៀបប្រើ ស្រោមអនាម័យសំរាប់ស្ត្រី (ចូរអានពីទំព័រ 190 ដល់ 191) ។
- ចូរស្វែងយល់អំពីបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងចំពោះស្ត្រីពិការមួយចំនួន នៅក្នុងការលេបថ្នាំណាមួយជាក់លាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺកាមរោគ ។
- ចូរសំគាល់មើលរោគសញ្ញានៃការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទ នៅពេលអ្នកជួបស្ត្រីដើម្បីពិនិត្យបញ្ហា សុខភាពអ្វីក៏ដោយ ។
- ចូរធ្វើយ៉ាងណាឱ្យស្ត្រីពិការមានច្រកទៅរកការពិគ្រោះបញ្ហានិងការធ្វើតេស្តវីរុសហ៊ីវ ។

បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចផ្តល់ការណែនាំដល់ឪពុកម្តាយរបស់កុមារពិការឱ្យបានដឹងច្បាស់ថា កុមារដែលបាន សិក្សាស្វែងយល់អំពីជំងឺកាមរោគ រួមទាំងវីរុសហ៊ីវ/អេដស៍ផងដែរនោះ នឹងចេះធ្វើការពិចារណាជ្រើសរើស ហើយចេះ គិតគូរពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននៅពេលអនាគត គឺពេលពួកគេធំពេញវ័យ ហើយចាប់ផ្តើមមានការរួមរក្ស ។